

TERCIARIO (Mioceno medio)

Trinidad

Referencia original: J. A. Cushman y R. M. Stainforth, 1945, p. 4-6.

Cushman y Stainforth (1945) y posteriormente Stainforth (1948) utilizaron la extensión muy restringida de *Globorotalia fohsi* para definir una zona de la cual ésta era la especie titular, en la Formación Cipero de Trinidad. Renz (1948) empleó el término *Globorotalia fohsi* en sentido similar para definir una subdivisión faunal de la Formación Pozón en Falcón. Posteriormente, Bolli (1950, 1951) demostró la evaluación lineal de la especie e indicó las apariciones sucesivas, con extensiones ligeramente traslapantes, de las cuatro subespecies: *G. fohsi barisanensis*, *G. fohsi fohsi*, *G. fohsi lobata* y *G. fohsi robusta*. El mismo autor (1957-c) dividió la Zona de *Globorotalia fohsi* original en cuatro zonas constituyentes, a base de estas subespecies.

En Venezuela, el reconocimiento de la Zona de *G. fohsi* (*sensu lato*, subdividida) ha sido mencionada por Blow (1959), Sulek (1961), Renz (1961-a, b), Stainforth (1961), Bolli (1962) y Lamb y Sulek (1965) en las formaciones Carapita, Oficina y Pozón.

Las primeras referencias publicadas le asignaron a la Zona de *Globorotalia fohsi* una edad Oligoceno Tardío. Estudios posteriores de correlación trasatlántica establecieron una edad Mioceno temprano (Burdigaliense) (Blow, 1959; Bolli, 1959; Stainforth, 1960-a, b), criterio adoptado en el Cuadro de Correlación del Primer Congreso Venezolano del Petróleo (Soc. Venez. Ing. Petról., 1963). No obstante, los estudios más recientes han mostrado la correspondencia de la zona con la parte inferior del Piso Langhiense, del Mioceno medio (Cati *et al.*, 1968).

Banner y Blow (1965) propusieron en forma preliminar y posteriormente, Blow y Banner (1966) más detalladamente, ciertas modificaciones a las subespecies de *Globorotalia fohsi* y a la zonación basada en sus extensiones. Bolli (1966, 1967) comentó las modificaciones propuestas, que en la práctica son de poca significación.

Referencias

Banner, F. T. y W. H. Blow, 1965. *Progress in the planktonic foraminiferal biostratigraphy of the Neogene*. Nature, 208(5016): 1164-1166.

Blow, W. H., 1959. Age, correlation and biostratigraphy of the Upper Tocuyo (San Lorenzo) and Pozón formations, eastern Falcón, Venezuela. *Bull. Amer. Paleont.*, 39(178): 67-252.

Bolli, H. M., 1950. The direction of coiling in the evolution of some *Globorotaliidae*. *Cushman Found. Foram. Res.*, Contrib., 1-3-4: 82-89.

Bolli, H. M., 1951. Notes on the direction of rotalid foraminifera. *Cushman Found. Foram. Res.*, 2-4: 139-143.

Bolli, H. M., 1957-c. Planktonic foraminifera from the Oligocene-Miocene Cipero and Lengua formations of Trinidad, *B.W.I. U.S. Nat. Mus.*, Bull., (215): 97-123.

Bolli, H. M., 1959-a. Planktonic foraminifera as index fossils in Trinidad, British West Indies and their value for world-wide stratigraphic correlation. *Eclog. Geol. Helv.*, 52(2): 627-637.

Bolli, H. M., 1959-b. Planktonic Foraminifera from the Cretaceous of Trinidad, *B.W.I., Bull. Am. Paleontol.*, 39: 257-277.

Bolli, H. M., 1962. *GLOBIGERINOPSIS*. A new genus of the foraminiferal family *GLOBIGERINADAE*. *Eclog. Geol. Helv.*, 55(1): 281-284.

Bolli, H. M., 1966. Zonation of Cretaceous to Pliocene marine sediments based on planktonic foraminifera. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 9(1): 3-32.

Cati, F.; M. L. Colalongo; U. Crescenti; S. D'Onofrio; U. Follador; C. Pirini Raddrizzani; A. Pomesano Cherchi; G. Salvarorini; S. Sartorini; I. Premoli Silva; C. F. Wezel; V. Bertolino; G. Bizon; H. M. Bolli; A. M. Borsetti Cati; L. Dondi; H. Feinberg; D. G. Jenkins; E. Perconing, M. Sampo y R. Sprovieri, 1968. Biostratigrafía del Neogeno mediterraneo basata sui foraminiferi planctonici. *Soc. Geol. Ital.*, Boll., 87, 491-503.

Cushman, J. A. y R. M. Stainforth, 1945. The foraminiferal fauna of the Cipero Marl Formation of Trinidad, *B.W.I. Cushman Lab. Foram. Res.*, Sp. Publ. 14, p. 3-75.

Lamb, J. L. y J. A. Sulek, 1965-a. Miocene turbidities in the Carapita formation of eastern Venezuela. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 8(3): 82.

Renz, H. H., 1948. Startigraphy and fauna of the Agua Salada Group, State of Falcón, Venezuela. *Geol. Soc. Amer.*, Mem. 32, p. 219.

Renz, H. H., 1961-a. Correlation of geologic formations in Venezuela. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Infor., 4(6): 199-203.

Renz, H. H., 1961-b. The Cretaceous-tertiary and Oligocene-Miocene boundaries in Venezuela: areply. (Nota técnica). *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 4(8): 259-261.

Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo, 1963. Aspectos de la industria petrolera en Venezuela. *I Cong. Venez. Petról.*, Caracas, 1962, 850 p. (Cuadro de correlación entre pág. 188-189). Reimpreso en: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 1963, 6(11); 1964, 7(5).

Stainforth, R. M., 1960-a. Estado Actual de las Correlaciones Trasatlánticas del Oligo-Mioceno por medio de Foraminíferos Plántonicos. *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem., I : 382-406.

Stainforth, R. M., 1960-b. Current status of trasatlantic Oligo-Miocene correlation by means of plancktonic foraminifera. *Micropaleontology*, 2(4): 219-230.

Stainforth, R. M., 1961. The Cretaceous-Tertiary and Oligocene-Miocene boundaries in Venezuela. (Nota técnica). *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 4(8): 256-258.

Sulek, J. A., 1961. Miocene correlations in the Maturín sub-basin. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 4(4): 131-139.

Enviar Comentarios

	
1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)

Esta pagina ha sido visitada  veces