




TERCIARIO (Mioceno Tardío?-Plioceno)

Estado Nueva Esparta

Referencia original: H. M. Bolli y P. J. Bermúdez, 1965, p. 132.

Bolli y Bermúdez (1965) establecieron esta zona, cuya sección tipo corresponde a parte de la Formación Cubagua, en el pozo Cubagua-1, entre los 849 y 1.435 pies de profundidad, en la isla de Cubagua, estado Nueva Esparta. Por definición, la zona es la biozona de *Globorotalia rnargaritae*, que aparentemente combine un intervalo estratigráfico corto con una distribución geográfica muy amplia. Se identifica en la región costanera del Golfo de Méjico, en el sur de los EE. W., la región mediterránea europea y en Java. La zona suprayace a la Zona de *Globorotalia dutertrei* e infrayace a la de *Globoquadrina altispira altispira*.

Los autores originales, como también Bolli (1966), ubicaron la zona en su totalidad en el Mioceno tardío. No obstante, los estudios más recientes (Cati *et al.*, 1968) indican que en su mayor parte la zona corresponde al Plioceno y se considera dudosa su extensión al Mioceno Tardío.

Referencias

Bolli, H. M., 1966. Zonation of Cretaceous to Pliocene marine sediments based on planktonic foraminifera. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 9(1): 3-32.

Bolli, H. M. y P. J. Bermúdez, 1965. Zonation based on planktonic foraminifera of Middle Miocene to Pliocene warm-water sediments. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 8(5): 121-149.

Cati, F.; M. L. Colalongo; U. Crescenti; S. D'Onofrio; U. Follador; C. Pirini Raddrizzani; A. Pomesano Cherchi; G. Salvarorini; S. Sartorini; I. Premoli Silva; C. F. Wezel; V. Bertolino; G. Bizon; H. M. Bolli; A. M. Borsetti Cati; L. Dondi; H. Feinberg; D. G. Jenkins; E. Perconing, M. Sampo y R. Sprovieri, 1968. Biostratigrafía del Neogeno mediterraneo basata sui foraminiferi planctonici. *Soc. Geol. Ital.*, Boll., 87, 491-503.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)