




TERCIARIO (Oligoceno)

Trinidad

Referencia original: H. M. Bolli, 1957-c, p. 99-100.

Bolli (1957-c) introdujo esta zona, definida por la extensión vital de la especie titular, como subdivisión de la anterior Zona de *Globigerina ciperoensis*, en la Formación Cipero de Trinidad.

Su reconocimiento en las lutitas de la Formación Areo de Venezuela oriental fue mencionado por Lagaaij (1963), Salvador (1964-a) y Lamb (1964-a, b).

En Falcón, Blow (1959) indicó su presencia en la Formación Guacharaca. La mayoría de los autores acepta su edad oligocena.

Véase [GLOBIGERINA CIPEROENSIS, Zona de.](#)

Referencias

Blow, W. H., 1959. Age, correlation and biostratigraphy of the Upper Tocuyo (San Lorenzo) and Pozón formations, eastern Falcón, Venezuela. *Bull. Amer. Paleont.*, 39(178): 67-252.

Bolli, H. M., 1957-c. Planktonic foraminifera from the Oligocene-Miocene Cipero and Lengua formations of Trinidad, *B.W.I. U.S. Nat. Mus., Bull.*, (215): 97-123.

Lagaaij, R., 1963. *CUPULADRIA CANARIENSIS* (Busk)-Portrait of a Bryozoan. *Paleontology*, 6-1: 172-217. Resumen (1963) en: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról., Bol. Inform.*, 6(5): 151-152.

Lamb, J. L., 1964-a. The stratigraphic occurrences and relationships of some Mid-Tertiary *Uvigerinas* and *Siphoguerinas*. *Micropaleontology*, 10(4): 457-576. Resumen (1964) en: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról., Bol. Inform.*, 7(12): 379.

Lamb, J. L., 1964-b. The geology and paleontology of the rio Aragua surface section, Serranía del Interior, State of Monagas, Venezuela. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról., Bol. Inform.*, 7(4): 111-123.

Salvador A., 1964-a. Proposed redefinition of the term "Tinajitas" in northeastern Venezuela. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról., Bol. Inform.*, 7(2): 53-64.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)

Esta pagina ha sido visitada  veces