




PRECAMBRICO

Estado Bolívar

Referencia original: R. P. Morrison, 1953, p. 43.

Consideraciones históricas: Esta unidad fue descrita originalmente por Morrison (1953) con el nombre de "Mármol Dolomítico" y considerada como miembro del "Grupo Imataca". Más tarde, el mismo autor (1956), utiliza el nombre de Formación Guacuripia para designar la unidad de mármol dolomítico expuesta en las colinas con rumbo este-oeste, que incluyen los cerros Pando, Lindero, Jiménez, Hacha y Guacuripia, estado Bolívar.

Localidad tipo: Acantilado al este del cerro Hacha, municipio foráneo El Palmar, estado Bolívar. Hoja de Cartografía Nacional "San Lorenzo" N° 7739, escala 1:100.000.

Descripción litológica: La formación consiste de mármol dolomítico de color, textura y composición muy uniformes en toda su zona conocida de afloramientos, característica que indica la pureza de la roca. Según Martín Bellizzia (1953), la roca, totalmente recrystalizada, es de color gris azulado claro a medio y brillo perlino; al microscopio exhibe textura granoblástica gruesa, bien definida, con cristales de calcita en agregados gruesos (10%) y dolomita como mineral dominante (85%), en cristales enhedrales y subhedrales con lamellas de maclación bien desarrolladas; como minerales accesorios se presentan forsterita, flogopita, actinolita, tremolita y muscovita (3%); la forsterita y tremolita-actinolita, no obstante su carácter accesorio, en algunas secciones sobrepasan el 10%. La meteorización produce óxidos de hierro y manganeso.

Contactos: La unidad infrayace discordantemente a esquistos hornbléndicos, observándose el contacto en varios pozos de prospección en el cerro Hacha, sin angularidad ni gradación entre dolomita y esquistos, lo cual sugiere una posible discordancia paralela. No se ha observado el contacto inferior, pero las relaciones estructurales y estratigráficas en las inmediaciones de los cerros Hacha y Guacuripia, indican un buzamiento abrupto de la foliación del gneis infrayacente, en contraste con la foliación horizontal del mármol, por lo cual se presume un contacto discordante entre ambos, según Drovenick *et al.* (1967).

Espesor: Se desconoce el espesor total. Según Morrison (1953), la sección mejor expuesta aflora en el extremo este del cerro Hacha en un farallón de 60 metros; sin embargo, en el río Guanaraparo se han medido unos 85 metros de espesor.

Extensión geográfica: A lo largo de la cadena de colinas este-oeste que incluye los cerros Pando, Lindero, Jiménez, Hacha y Guacuripia, desde el río Curipiama cerca del poblado de El Palmar, en dirección oeste hasta unos 3 kilómetros del cerro Peluca, situado unos 20 kilómetros al este de Upata.

Edad: Precámbrico Temprano, a base de la inclusión de la formación en la sección de Imataca por Morrison (1953) y Drovenik *et al.* (1967).

Correlación: No se han establecido correlaciones entre la Formación Guacuripia y otras unidades del escudo de Guayana.

Importancia económica: El mármol dolomítico tiene utilidad como fundente en la industria del acero, principalmente en la fabricación de ferrosilicio y ferromanganeso.

Ambiente Tectónico y Petrogénesis: Morrison (1953) señala que es muy probable que el mármol dolomítico haya sido originalmente un sedimento sujeto a moderado metamorfismo termal, el cual motivó recrystalización completa.

© M. E. M., 26 de Noviembre de 1997

Referencias

Drovenik, F., Z. Krulc, M. Tadjer y S. Talic, 1967. Menas manganesíferas de la región de Upata. *Bol. Geol.*, Caracas, 8(17): 3-163.

Martín Bellizzia, C., 1953. Petrografía de rocas provenientes de Guacuripia, Estado Bolívar. *Rev. Hidroc. y Minas*. Caracas. 4(13): 73-77.

Morrison, R. P., 1953. Informe geológico de la zona manganesífera del Cerro Guacuripia, *Revista de Hidrocarburos y Minas*, Ministerio de Minas e Hidrocarburos (Venezuela), Venezuela, 4(13): 43-71.

Morrison, R. P., 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela, *Bol. Geol.*, Pub. Esp.º 1, pág. 270.

Enviar Comentarios

2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)