




TRIASICO - JURASICO

Estado Zulia

Referencia original: O. Renz, 1960, p. 320-321.

Consideraciones históricas: Renz (1960) introdujo el término Formación Guasasapa, para designar a la unidad basal del Grupo Cojoro, en la zona sureste de la península de la Guajira. Rollins (1965) y Geyer (1973) no reconocieron la formación, considerándola como integrante de la Formación Rancho Grande, unidad intermedia del Grupo Cojoro, según la descripción de Renz. Mojica y Dorado (1987) la citan al describir la estratigrafía de la Guajira suroccidental (cerro Uitpana y alrededores), sin definirse sobre su aceptación.

Localidad tipo: Loma Guasasapa, sobre la frontera entre Colombia y Venezuela, a unos 3 km al sur del cerro Cojoro, en la parte sureste de la península de la Guajira, (Hoja 5851, esc. 1:100.000, Cartografía Nacional).

Descripción litológica: Renz (*op. cit.*) describe a la unidad como formación; está constituida por areniscas arcósicas de grano medio a grueso, de color castaño rojizo a púrpura, micáceas, con vetillas de guijarros, conglomerados de guijarros de granitos, anfíbolitas y cuarcitas y limolitas micáceas de color púrpura. En la base de la formación, e intercalado con las rocas clásticas, se encuentran flujos de lava dacítica. Se observa estratificación cruzada, nódulos de arcilla y restos de troncos de árboles silicificados.

Espesor: En la descripción original de Renz (*op. cit.*) no se indica el espesor de la formación.

Extensión geográfica: Según Renz (mapa fig. 6), la Formación Guasasapa se presenta en una serie de pequeños afloramientos aislados en la serranía de Cojoro y en lomas de poco relieve, al sur de ésta.

Contactos: De acuerdo con la descripción original de Renz, la Formación Guasasapa yace discordantemente sobre el basamento granítico (Batolito de Siapana, según Mojica y Dorado, 1987). En el tope, pasa tansicionalmente a la Formación Rancho Grande.

Fósiles: Con la excepción de restos de árboles silicificados en la parte superior del intervalo, no se encuentran fósiles en la formación.

Edad: Renz (*op. cit.*) asignó la Formación Guasasapa, con el resto del Grupo Cojoro, al Triásico. Mojica y Dorado (1987) concluyen, que el límite Triásico Jurásico está contenido en la Formación Rancho Grande, lo cual significa una edad Triásico tardío para la Formación Guasasapa.

Correlación: La Formación Guasasapa se considera correlativa con la Formación La Quinta.

Paleoambiente: En base a su litología y contenido de restos vegetales, Renz (*op. cit.*) considera que la Formación Guasasapa representa un ambiente fluvio-terrestre y lagunal, inicio de un ciclo sedimentario completo integrado por el Grupo Cojoro en su totalidad.

© P. Jam L., 1997

Referencias

Geyer, 1973. ??????????????????????

Mojica y Dorado, 1987. ??????????????????

Renz, O., 1960-a. Remarks on the Barquisimeto Trough. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 3(7): 155-160.

Renz, O., 1960-b. Guía de la excursión C-8. Andes nororientales. Barquisimeto-Barbacoas (Estado Lara). *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem., 1: 93-97.

Rollins, 1965. Stratigraphy and structure of the Goajira Península, northwestern Venezuela and northeastern Colombia. Univ. of Nebraska Studies, *New Series*, (30): 102.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Garner, A. H., 1926. Suggested nomenclature and correlation of geological formations in Venezuela. *Amer. Inst. Min. Metall. Eng.*, Trans: 677-684.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)