




CRETACICO (Maastrichtiense)

Estado Anzoátegui

Referencia original: H. H. Renz, 1962, Cuadro.

A base de faunas de foraminíferos, Renz (1962) estableció una doble zonación (bentónica y planctónica) en los sedimentos del Cretácico Tardío y Terciario Temprano de la sección del río Querecual, Anzoátegui nororiental. Subdividió la parte inferior (Cretácico) de la Formación Vidoño en dos zonas bentónicas, de las cuales la inferior es la de *Haplophragmoiles excavata*, subdividida a su vez en dos subzonas, la superior de las cuales es la de *Gaudryina foeda*. Renz no describió sus zonas y subzonas bentónicas, ni mostró en su cuadro faunal ninguna especie restringida a la Subzona de *Gaudryina foeda*. En la sección del río Querecual esta subzona abarca los sedimentos de la parte inferior de la Formación Vidoño, por encima de la Subzona de *Guembelina excolata*, y es de edad Maastrichtiense.

Véase [HAPLOPHRAGMOIDES EXCAVATA, Zona de](#)

Referencias

Renz, H. H., 1962. Stratigraphy and paleontology of the type section of Santa Anita Group and overlying Merecure Group, río Querecual, State of Anzoátegui, northeastern Venezuela. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol.*, Bol. Inform. 5(4): 89-108.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)