




CRETACICO (Maastrichtiense)

Estado Anzoátegui

Referencia original: H. H. Renz, 1962, Cuadro.

A base de foraminíferos bentónicos y planctónicos, Renz (1962) estableció una doble zonación en los sedimentos del Cretácico Tardío y Terciario Temprano de la sección del río Querecual, Anzoátegui nororiental. Subdividió la parte inferior (cretácica) de la Formación Vidoño en dos zonas bentónicas, de las cuales la inferior es la de *Haplophragmoides excavata* que corresponde a la Zona de *Guembelina-Siphogenerinoides* de Hedberg y Pyre (1944).

Renz no describió sus divisiones bentónicas, pero en su cuadro faunal indicó que *Guembelina excolata* es la única especie restringida a la Zona de *Haplophragmoides excavata* en la sección tipo; subdividió la zona en dos subzonas: de *Guembelina excolata*, inferior, y de *Gaudryina foeda*, superior.

En la sección tipo del río Querecual la Zona de *Haplophragmoides excavata* corresponde a la parte basal de la Formación Vidoño y es de edad Maastrichtiense.

Referencias

Hedberg, H. D. y A. Pyre, 1944. stratigraphy of northeastern Anzoátegui, Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 20(1): 1-28.

Renz, H. H., 1962. Stratigraphy and paleontology of the type section of Santa Anita Group and overlying Merecure Group, río Querecual, State of Anzoátegui, northeastern Venezuela. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol., Bol. Inform.* 5(4): 89-108.

Enviar Comentarios



**Comentarios
Recibidos**



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)