

TERCIARIO (Eoceno Medio-? Tardío)

Estado Portuguesa

Referencia original: S. Osuna; O. Macsotay y R. Arnstein, 1995, p. 84.

Consideraciones históricas: Osuna, *et al.* (1995) fueron los primeros en proponer por publicación la división de la Formación Pagüey en tres miembros que, en orden ascendente, son los "miembros" Arandia, La California y Higüerones. Los nombres fueron propuestos originalmente por Aguasuelos (1990, p. 198) y discutidos luego por Osuna (1994) en informes inéditos. Las dificultades en diferenciar los cambios sutiles de sus litologías, definir lateral y verticalmente sus contactos transicionales, y trazar las unidades regionalmente hacen dudoso su utilidad como nombres estratigráficos formales. Se aplican estos nombres informales principalmente en el área de afloramiento entre los ríos Santo Domingo y Calderas, y hasta el río Tucupido.

La sección tipo del miembro Higüerones está en la quebrada Higüerones, estado Portuguesa; de mas fácil acceso es la sección de referencia en la carretera Tucupido-represa Tucupido. Osuna *et al.* (1995) describen el miembro compuesto de unos 705 m de una alternancia monótona de lutitas y areniscas con algunos lentes de limolitas y calizas impuras. En su base, contiene capas métricas de lutitas arenosas con capas centimétricas de concreciones ferruginosas en forma de rosario. Las areniscas muestran estructuras sedimentarias como bases abruptas con moldes de carga, abundante icnofauna y estratificación cruzada, paralela y ondulada; el miembro es transicional con la suprayacente Formación Tilangona. Contienen abundantes estructuras sedimentarias, icnofósiles y macrofósiles que indican un ambiente costero a nerítico interno, que alcanza localmente a nerítico medio a externo. Su edad, basado en polen y foraminíferos planctónicos, es Eoceno Medio, parte superior a Eoceno Tardío. Arnstein, Monroy y Di Gianni (en Osuna *op. cit.*, p. 34-35), en las secciones de las quebradas Parángula, Bellaca, Arandia e Higüerones, reportan los siguientes fósiles: Microfauna: *Acarinina* sp., *Globigerinatheka* sp. Nannoplancton: *Coccolithus pelagicus* *Ericsonia* sp., *Helicosphaera lophota*, y *Discoaster tani*. Palinomorfos: *Bombacacidites soleaformis*, *B. forereticulatus*, *Retitricolporites* sp., *Janmulleripollis pentaradiatus*, *Echitriporites trianguliformis* "A", *Bombacacidites foveoreticulatus*. La asociación de palinomorfos determinan la zona 22/23 del Eoceno Medio. El conjunto de nannoplancton extienden el rango de la unidad al Eoceno Tardío, Zona NP17-NP18. La microfauna bentónica representa condiciones que varían de plataforma interna a media. La icnofauna del Miembro Higüerones es un conjunto que representa condiciones que varía de plataforma externa en la base a plataforma interna en el tope: *Thalassinoides*, *Planilites*, *Cochichnus*, *Bergaueria* y *Tigillites*. Al sureste de la ciudad de Barinas, en el pozo Torunos- 1X, Monroy (1995) identificó en muestras de la parte superior de la Formación Pagüey, los palinomorfos *Clavinaaperturites microclavatus*, *Cicatricosisporites doregensis* y *Striaticolporites seamjiiformis* que determinan la zona Z-24 del Eoceno Tardío. La unidad suprayacente es reconocida como Formación Parángula, donde no se encontraron fósiles que precisen la edad de esta secuencia. El suscrito opina que la extensión de la edad de la Formación Pagüey, hasta el Eoceno Tardío requiere estudios adicionales. A través de casi toda Venezuela, el final del Eoceno Medio se distingue por un período de levantamiento y erosión, seguido por una transgresión marina regional durante el Eoceno Tardío/Oligoceno/Mioceno Temprano, representado por un nuevo ciclo de sedimentación que transgrede discordantemente al Eoceno Medio erosionado. No obstante no se descarta una transición Eoceno Medio/Eoceno tardío en las localidades mencionadas.

Véase [PAGÜEY, Formación](#).

© G. G. Kiser, 1997

Referencias

Aguasuelos Ingeniería, S. C., 1990 Modernización de datos geológicos en el frente de montaña. Vol. III, Estratigrafía/Sedimentología. Corpoven S.A. *Informe Inédito*, 517 p.

Monroy, Z. de, 1995. Estudio palinológico del pozo Torunos 1X. Corpoven S. A., Informe Inédito.

Osuna, S., 1994. Geología de superficie del frente de montañas de Barinas. *Informe inédito Corpoven, S. A.*, 86 p.

Osuna, S., O. Macsotay y R. Arnstein, 1995. Sedimentación de anfosa Eoceno medio-superior en Barinas, Venezuela. *Boletín de Geología*, Publicación Especial 11.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)