


**PRECAMBRICO TARDIO**

Estado Mérida

Referencia original: E. Kündig, 1938-a, p. 22

Consideraciones históricas: Kündig (1938) introdujo este nombre para definir someramente una unidad heterogénea de rocas sedimentarias e ígneas, intensamente metamorfizadas. Sutton (1946), añadió algunos datos sobre la unidad. Schubert (1968), estudió sus afloramientos en la región de Barinitas-Santo Domingo, donde subdividió al grupo en tres unidades informales de uso local. Incluido por Benedetto (1982) en la Zona 3 de su Zonación tectónico estratigráfica del noroeste de América del Sur y por Bellizzia y Pimentel (1994) aplican la denominación de Complejo Iglesias para referirse al basamento del llamado Terreno o Dominio Mérida.

Localidad tipo: La unidad tiene su localidad tipo en el cerro Las Iglesias, Macizo de Los Conejos, al noroeste de la ciudad de Mérida. (Hoja 5941, escala 1:100.000 de Cartografía Nacional). Buenos afloramientos se observan en los flancos oeste y sureste (Macizo de los Gatos), de los andes merideños y en la región de Barinitas-Santo Domingo, estado Barinas.

Descripción litológica: Kündig (1938) describió en el Páramo de Los Conejos, ortogneises biotíticos, gneises migmatíticos con inyecciones aplíticas "Lit-Par-Lit", augengneis pórfido, blásticos biotíticos de grano grueso, gneiss de grano fino, con granate y biotita y micaesquistos granatíferos. En el Macizo de Los Gatos afloran gneises dioríticos y graníticos, escasos paragneises y sills de anfibolita. La unidad ha sido dividida en tres formaciones: Sierra Nevada, Bella Vista y Tostosa, las cuales son tratadas por Bellizzia y Pimentel (*op. cit.*) como unidades litodémicas con el rango de asociaciones. En Barinitas-Santo Domingo, Schubert (1968) reconoció tres unidades informales, que de más antigua a más joven, designa como sigue: Gneis Bandeado de la Mitisus, Esquistos y Cuarcitas del Alambique y Gneis Granítico de La Raya. De acuerdo a Bellizzia y Pimentel (*op. cit.*) la unidad se compone esencialmente de esquistos y gneises cuarzo-faldespático-micáceo-granatíferos, ortogneises graníticos y anfibolitas; localmente se encuentran cuerpos lenticulares de cuarcitas, migmatitas y mármoles y en el tope de la sección, esquistos pelíticos bien laminados con estaurolita, andalusita y cianita. Es interesante mencionar, que en esta asociación litológica, no se han encontrado rocas granulíticas, aunque localmente el grado metamórfico alcanza la catazona (anatexis). El prototipo del Complejo Iglesias, considerado esencialmente de origen sedimentario, es en parte de origen magmático, de acuerdo a las peculiaridades petrológicas, geoquímicas y magmáticas Bellizzia y Pimentel (*op. cit.*). El conjunto litológico se depositó posiblemente en un ambiente plataformal.

Espesor: El espesor del grupo no se ha determinado.

Extensión geográfica: Las rocas que integran este grupo, están expuestas ampliamente en la región central andina. Los mayores afloramientos se encuentran en el cerro Las Iglesias, Macizos de Los Conejos, al noroeste de la ciudad de Mérida y en la sierra Nevada de Mérida; localmente se extiende hacia el sur, hasta los alrededores de Chacantá. También afloran en la región de Santo Domingo, y en el Macizo del Colorado, en los estados Mérida y Barinas.

Contactos: El contacto inferior no se ha podido determinar. El contacto superior puede presentarse en contacto de falla, o en discordancia con unidades paleozoicas y mesozoicas.

Fósiles: No se han mencionado fósiles para la unidad.

Edad: Su edad se considera Precámbrico tardío, en base a relaciones de campo y a determinaciones radiométricas.

Correlación: Posiblemente se correlaciona con la serie de Perijá (Hea y Whitman, 1960), ahora Asociación perijá (Bellizzia y Pimentel, *op. cit.*).

Importancia económica: En el Grupo Iglesias se ubican desarrollos de esquistos staurolíticos, los cuales son considerados posibles menas de aluminio. En la misma unidad, se han ubicado importantes yacimientos de feldespato y mica, esquistos silimaníticos y gneises andalucíticos.

Sinonimia: Serie Iglesias, Grupo Iglesias.

© **M. E. M. 3er Léxico**

Referencias

Bellizzia, A. y N. Pimentel, 1994. Terreno Mérida: Un cinturón alóctono Herciniano en la Cordillera de Los Andes de Venezuela. *V Simp. Boliv., Explor. Petrol., Cuencas Subandinas*, Puerto La Cruzm, p. 271-290.

Benedetto, G., 1982. ??????????????????

Hea, J. P. y Whitman, A. B., 1960. Estratigrafía y petrología de los sedimentos precretácicos de la parte norte-central de la Sierra de Perijá, Estado Zulia, Venezuela. *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem. 1: 351-376.

Kündig, E., 1938-a. Las rocas pre-Cretáceas de los Andes centrales de Venezuela con algunas observaciones sobre su tectónica. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 2(2-4): 21-43

Kündig, E., 1938-b. The Precretaceous Rocks of the central Venezuelan andes with some remarks about the tectonics, *Bol. Geol. y Min.*, (Venezuela), 2(2-4): 21-43. (Ed. en Inglés).

Schubert, C., 1968. Geología de la Región de Barinitas-Santo Domingo, Andes venezolanos surorientales. *Bol. Geol.*, 5, 9(19): 181-261.

Sutton, F. A., 1946. Geology of Maracaibo, Basin, Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 30(10): 1621-1741.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Bass, M. N. y R. Shagam, 1960. Edades Rb-Sr de las Rocas Cristalinas de los andes merideños, Venezuela, Mem., *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1: 377-381.

Compañía Shell de Venezuela and Creole Petroleum Corporation, 1964. Paleozoic Rocks of Mérida Andes, Venezuela. *Am. Ass. Petrol. Geol.*, Bull., 48(1): 70-84.

Christ, P., 1927. La Coupe Geologique le long du chemin de Mucuchachí a Santa Bárbara dans les andes Venezueliennes, *Eclog. Helv*, 20(3): 397-414.

Martín Bellizzia, C., 1968. Edades isotrópicas de rocas venezolanas. *Bol. Geol.*, Caracas, 9(19): 356-380.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela. *Bol. Geol. Public. Espec.* 1, 728 p.

Oppenheim, V., 1937-a. Contribución a la geología de los Andes Venezolanos, *Bol. Geol. y Min.* (Venezuela), 1(2-4): 23-45.

Oppenheim, V., 1937-b. Contribution to the geology of the Venezuelan Andes. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1(2-4): 25-43.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)