

PRECAMBRICO

Estado Bolívar

Referencia original: S. E. Aguerrevere, V. M. López, C. Delgado y C. A. Freeman, 1939, p. 660.

Consideraciones históricas: Aguerrevere, S. E. *et al.*, (1939) señalan a un gran sill de rocas ígneas intrusiva las areniscas, en el valle de Kamarata, región de la Gran Sabana, estado Bolívar, Municipio Autónomo Gran Sabana. Aguerrevere, S. E. *et al.* (1939) señalaron dos períodos de actividad ígnea: una primera intrusión básica en forma de sill de gabro, de composición mineralógica y química muy uniforme, y una segunda intrusión ácida que corta al sill en forma de dique, de composición bastante variable. El sill toma forma de lacolito en diversas localidades. El término es informal por su definición imprecisa.

© M. E. M., 26 de Noviembre de 1997

Referencias

Aguerrevere, S. E., V. M. López, C. Delgado y C. A. Freeman, 1939. Exploración de la Gran Sabana, *Rev. Fomento*, Caracas, 3(19): 501-729. Reimpresión de las conclusiones, *Rev. Fomento*, Caracas, 1948, 8(64): 127-231.

Enviar Comentarios

	
2a Edición LEV	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)