




TERCIARIO (Plioceno Temprano)

Estado Nueva Esparta

Referencia original: Sellier De Civrieux, 1959.

Consideraciones históricas: Sellier De Civrieux (1959) describió sedimentos pelíticos-calcareos, expuestos en un corte de carretera cerca del caserío Las Hernández, en la parte occidental de Margarita oriental (Paraguaychoa), con el nombre de Arcillas Margosas de Las Hernández. Bermúdez (1966) modificó el término a Capas de Las Hernández, que consideró como miembro superior de la Formación Cubagua en Margarita, corrigiendo la identificación micropaleontológica de Sellier De Civrieux (1959). Consiste en arcillas margosas no consolidadas, algo limosas y limolíticas, de color crema amarillento y anarajado, que afloran en el cruce de las carreteras Porlamar-Punta de Piedras, con la carretera de Macanao. Su rica macrofauna de foraminíferos planctónicos, la incluye en la Zona de *Globorotalia margaritae* del Plioceno inferior (Hunter, 1978-a). El tratamiento de miembro es confirmado por Hunter (1978-a), quien demuestra la continuidad bioestratigráfica entre los miembros de la Formación Cubagua en la isla de Margarita. La segunda edición del Léxico Estratigráfico consideró a esta unidad, como informal.

Véase [CUBAGUA, Formación](#), [LA GUICA, Miembro](#).

© **O. Macsotay, 1997**

Referencias

Bermúdez, P. J., 1966. Consideraciones sobre los sedimentos del Mioceno medio al reciente de las costas central y oriental de Venezuela. (Primera parte). *Bol. Geol.*, Caracas, 7(14): 333-411.

Hunter, V. F., 1978. Notes on the Tertiary Stratigraphy of Margarita Island". *Geologie en Mijnbouw*. 57: 189-192.

Sellier de Civrieux, J. M., 1959. Apuntes bioestratigráficos sobre una nueva sección del Mioceno en la Isla de Margarita. *Bol. Geol.*, Caracas, 5(10): 81-91.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)