


**PRECAMBRICO**

Estado Bolívar

Referencia original: A. Espejo, 1974, p. 233.

Consideraciones históricas: El término fue publicado originalmente por Espejo (1974) para designar un cuerpo granítico de forma ovalada que aflora en las inmediaciones del hato Las Queseras en la parte noroccidental de la región El Manteco - Gurí.

Localidad tipo: El autor no hace mención de sección tipo para la unidad. El plutón está ubicado en la hoja de la Cartografía Nacional N° 7638, municipio autónomo Piar del estado Bolívar.

Descripción litológica: La roca es de grano grueso a medio, color gris claro, pobre en máficos, generalmente con foliación hacia los bordes del cuerpo; hacia su parte central exhibe marcada lineación mineral. Presenta textura hipautomórfica granular con plagioclasa, cuarzo y microclino. La plagioclasa es albita - oligoclasa casi inalterada, anhedral a subhedral. El feldespato potásico es microclino en cristales anhedrales, menores de 3 mm, o con desarrollo de microclino - peritita. El máfico es biotita en cantidades menores a 8 % y hasta 12 % en los bordes del plutón. Como accesorios, contiene esfena, apatito y óxido de hierro. El bajo contenido de máficos y la composición de la plagioclasa permite clasificarlo como granito alaskítico (Espejo, *op. cit.*).

Ambiente tectónico y petrogénesis: Según Espejo (1974), los caracteres mineralógicos y químicos de esta roca, las estructuras miarolíticas y sus relaciones estructurales y metamórficas con la roca caja indica que es un granito emplazado a poca profundidad en un ambiente cratónico relativamente frío y estable. Podrían representar intrusiones postectónicas relacionadas con diferenciación a profundidad, de una última removilización de las rocas del Escudo, que afectó principalmente la parte oriental de la Guayana Venezolana. Este evento anorogénico es designado por Espejo y Santamaría (1974) como Evento Plutónico El Manteco.

Contactos: El granito intrusión rocas del Complejo de Supamo hasta los niveles inferiores de la secuencia volcano-sedimentaria; se encuentra abundante xenolitos de trondhjemitas procedentes del Complejo en la zona de contacto.

Extensión geográfica: Aflora sobre un área de unos 35 km² en la parte Nor-Occidental de la región El Manteco - Gurí; en las inmediaciones del hato Las Queseras. Pequeños cuerpos de granito alaskítico, que afloran, uno en la quebrada Morichal Ancho al norte del plutón principal, y otro 4 Km al oeste del hato La Australia, podrían representar apófisis de la intrusión principal.

Edad: Precámbrico. Se determinó una edad aproximada de 1.480 m.a. (Espejo y Santamaría, 1974) por K-Ar en roca total y en biotita provenientes de la unidad.

Importancia económica: Posiblemente constituyan cierto alineamiento con zona de baja gravedad que sirvieran como vehículo para enriquecimiento en minerales básicos (Espejo, 1974) en la secuencia volcano-sedimentaria que intrusión.

© M. E. M., 15 de Octubre de 1997

Referencias

Espejo, A., 1974. Guía de la excursión N° 3, Upata-El Manteco. *IX Conf. Geol. Interguayanas*, Ciudad Guayana, estado Bolívar, p. 68-83.

Espejo, A. y F. Santamaría, 1974. Significado de nuevas determinaciones de edades, potasio-argón en la Guayana venezolana, *IX Conf. Geol. Interguayanas*, Ciudad Guayana, estado Bolívar, p. 424-430.



**Comentarios
Recibidos**



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)