


**PRECAMBRICO**

Estado Bolívar

Referencia original: V. Tepedino, 1981, p. 160.

Consideraciones históricas: Tepedino (1981) designa con este nombre a unas rocas de composición granítica que afloran en el curso del río Caura entre el poblado de Puerto Cabello, al norte y al sur y este de los caseríos Las trincheras y Jabillal. Esta descripción aunque bastante completa, se considera informal. Es muy posible que estos granitos, como lo menciona el autor, puedan representar una facies del granito de Santa Rosalía.

Localidad tipo: En el curso y margen derecha del río Caura, entre los poblados de Puerto Cabello al norte y las Trincheras al sur, (Hoja 7236, esc. 1:100000, Cartografía Nacional).

Descripción litológica: La roca es de grano medio a grueso, masivo a debilmente foliado, biotítico, porfídico, con ferrocristales de feldespato de 2-3 cm. de diámetro promedio y excepcionalmente hasta de 6 cm. La granulacidad varía de norte a sur en el área de afloramiento, al norte es de grano medio con debil foliación, a medida que se avanza hacia el sur se hace de grano más grueso, porfiroblástico, con desarrollo de augens y se observa textura gneisica definida por bandas biotíticas. Luego hacia el borde sur, la roca es de grano más fino y foliada.

Ambiente Tectónico y Petrogénesis: Tepedino (*op. cit.*), observa que, salvo ciertas diferencias en porcentajes de Fe₂O₃, CaO, MgO y Na₂O, la composición química promedio (elementos mayores) de rocas de la unidad y del Granito de Santa Rosalía es bastante similar y considera, en forma preliminar, que ambas unidades son comagmáticas.

Extensión geográfica: Aflora en el curso y en la margen derecha del río Caura, entre las poblaciones de Puerto Cabello y las Trincheras y hacia el este hasta las cabeceras del río Caura. Alcanzando un área de afloramiento de aproximadamente 250 km² y soporta las mayores elevaciones de la región, como son el Cerro La Prisión y las Lajas La Gallita y la Hormigosa.

Contactos: No se mencionan en la descripción original. Se observa en el mapa un contacto injerido con rocas del Complejo de Imataca hacia el este.

Edad: Precámbrico. Tepedino (*op. cit.*) sugiere que la unidad es comagmática con el Granito de Santa Rosalía.

Correlación: El autor considera que pudiera representar una facies del Granito de Santa Rosalía. Sin embargo, podría tomarse en consideración una equivalencia con el Granito rapapakivi del Parguaza visto el desarrollo de ferrocristales de feldespato de hasta 6 cms. Por otra parte la composición química muestra similitud tanto con la de los granitos de El Parguaza como con la de los granitos de Santa Rosalía.

Geoquímica: Los granitos muestran altos contenidos de SiO₂, CaO, K₂O, K₂O/Na₂O y bajos a moderados contenidos de MgO, CaO.

Importancia económica: Este tipo de granitos son fuentes probables de casiterita y de columbita tantalita.

© J. H. Rios, 1997

Referencias

Tepedino, V., 1985. Geología de la región del Bajo Caura, Estado Bolívar. *I Simposium Amazónico*, Puerto Ayacucho, 1981. Ministerio de Energía y Minas. Dir. de Geología. Public. Especial 10: 151-162



**Comentarios
Recibidos**



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)