


**DEVONICO**

Estado Zulia

Referencia original: J. M. Bowen, 1972, p. 729-760.

Consideraciones históricas: Bowen (1972) introduce el nombre de Formación Los Guineos, para designar una sección de 300 m de espesor de clásticos fosilíferos del Devónico inferior, discordante sobre el Granito de Lajas y en contacto de falla en su tope, con la Formación Río Palmar del carbonífero, y con la Formación La Quinta. Ortiz (1977) describe la formación, en la región comprendida entre las cabeceras de los ríos Palmar y Lajas.

Localidad tipo: La sección tipo se midió en el caño Los Guineos, tributario occidental del río Lajas. Hoja 5647. Escala 1:100.000 de Cartografía Nacional.

Descripción litológica: En su base se presentan 20 m de una brecha de gujarros, discordante sobre el Granito de Lajas, bastante bien escogida, bien litificada, compuesta principalmente de gujarros angulares de cuarzo de veta, y de escasas cuarcitas finas gris. Le siguen 6 m de arenisca cuarcítica gruesa, mal escogida, de color gris pardo, con estratificación cruzada, cubierta a su vez, por 3 m de brecha de gujarros de cuarzo. Suprayacente a esta secuencia, aparecen lutitas limosas, grises, ligeramente filíticas y areniscas laminadas en estratos delgados, con ocasionales lechos más espesos de areniscas, a menudo lenticulares, con estratificación cruzada, de grano medio a grueso, mal escogidas y de color gris pardo, y de areniscas arcóscicas. En la parte media y superior de la unidad, predominan las areniscas, seguidas por lutitas grises, algunas areniscas de color gris-púrpura, limolitas y lutitas limosas, y finalmente, se encuentran calizas negras fosilíferas y margas limosas, con abundantes macrofósiles de color gris oscuro.

Espesor: El espesor estimado para la unidad, es de 350 a 400 m.

Extensión geográfica: Esta formación aflora en una zona comprendida entre el río Lajas y su afluente, la quebrada Los Guineos, en la sierra de Perijá.

Expresión topográfica: Ninguna.

Contactos: La Formación Los Guineos es discordante sobre el Granito de Lajas, e infrayace en contacto de falla a la Formación Río Palmar, Formación La Quinta y Río Negro.

Fósiles: Se obtuvo una rica fauna en varios horizontes fosilíferos de la parte superior de la unidad, compuesta fundamentalmente por Braquiópodos, Bivalvos, Briozoarios y Equinodermos. Se determinaron las siguientes especies: *Acrospirifer olsoni* Caster; *Amphigenia elongata* Harris; *Atrypa harris* Caster; *Eoderonaria imperialis* Caster; *Chonetes* sp., *Elytha colombiana* Caster; *Leptaena boyaca* Caster; *Rhipidomella liddlei* Harris; *Spirifer weisbordi* Harris; *Aviculopecten* sp., placas de Crinoideos; *Fenestella* sp.

Edad: Los elementos faunales diagnósticos, corresponden a la parte superior del Devónico Inferior.

Correlación: Ninguna.

Paleoambientes: La fauna nerítica indica un ambiente marino, de aguas llanas.

Importancia económica: Ninguna.

Sinonimia: Ninguna.

© O. Odremán y A. Useche C., 1997

Referencias

Bowen, J. M., 1972. Estratigrafía del precretáceo en la parte norte de la Sierra de Perijá. *IV Cong. Geol. Venez.*, Mem. 2: 729-760.

Ortíz, H. J., 1977. Geología de la cabeceras de los ríos Palmar y Lajas, Sierra de Perijá, Estado Zulia. *V Cong. Geol. Venez.*, Mem. 1: 315-325.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)