




TERCIARIO (Mioceno)

Estado Zulia

Referencia original: R. A. Liddle, 1928, p. 308-312.

Consideraciones históricas: El término Formación Los Ranchos fue publicado originalmente por Liddle (1928), quien según Miller (1956), tomó probablemente el nombre de informes privados de C. St. J. Brenner en 1926 ó 1927. Hedberg y Sass (1937), Liddle (1946) y Sutton (1947), describen la formación en términos similares a los de la descripción original. Miller (*op. cit.*) considera que la sección tipo no había sido adecuadamente establecida, y propone una al suroeste de La Villa del Rosario, Perijá, dando una descripción detallada de los afloramientos. Young (1958), la describe brevemente al reseñar las formaciones oligo-miocenas del oeste del lago de Maracaibo. Quijada y Caldera (1985), mencionan la formación en el subsuelo del campo Alpuf.

Localidad tipo: Finca Los Ranchos, a 15 km al noreste de Machiques, distrito Perijá, estado Zulia. La sección propuesta por Miller (*op. cit.*) está en el camino que sale hacia el oeste, en el kilómetro 98 de la carretera de Perijá, 12 km al suroeste de La Villa del Rosario. El tope está a 3,8 km del cruce con la carretera a la base, a unos 5 km más adelante, "... a unos 200 ó 300 m al este del puente sobre el caño del Polvo, y a 1200 ó 1300 m al este del pozo Zulia 20 D-1. Ninguno de los dos contactos es visible en el camino". El contacto superior se encuentra en la base oriental de un cerro prominente, ubicado alrededor de 400 m al norte del camino y a 3,6 km (distancia aérea) de la carretera de Perijá. (Miller, *op. cit.*). Hoja 5746, escala 1:100.000, Cartografía Nacional.

Descripción litológica: El área tipo Los Ranchos está compuesta en un 50 ó 60%, por areniscas bien estratificadas, micáceas y ferruginosas con algunas capas delgadas de areniscas conglomeráticas y conglomerados, el resto de la litología se compone de lutitas arcillosas grises, y arcilitas. Al sur del río Apón, en la parte central de Perijá, el contenido de lutitas grises alcanza a más de las tres cuartas partes de los afloramientos, combinadas con areniscas ferruginosas delgadas, con estratificación cruzada (Miller, *op.cit.*).

Espesor: En la sección tipo, el espesor de la Formación Los Ranchos es de 1500 m (Miller *op. cit.*); según el L.E.V. (1970), en los pozos cercanos se han penetrado 1300 m. En el campo Alturitas Key (1960), indica 790 m.

Extensión geográfica: La Formación Los Ranchos aflora en la zona piemontina de la sierra de Perijá, en el distrito Perijá. En el distrito Mara, Sutton (1946), menciona afloramientos al este de la falla de Los Ocho, entre los ríos Cachirí y Guasare y a lo largo del eje del sinclinal de Manuelote. En el subsuelo, la formación se extiende hacia el este, hasta pasar a la Formación Lagunillas cerca de la costa occidental del lago de Maracaibo.

Expresión topográfica: Las areniscas de Los Ranchos son más resistentes a la erosión, que los sedimentos de la Formación La Villa suprayacente, o del Grupo El Fausto infrayacente, originando una topografía escarpada en forma de sierras y serranías, con pendiente hacia el lago de Maracaibo.

Contactos: La Formación Los Ranchos yace concordantemente sobre la Formación Cuiba, unidad superior del Grupo El Fausto, caracterizándose el contacto por el paso de las arcilitas casi puras de Cuiba a las areniscas de Los Ranchos. En el tope, la formación es concordante y transicional con la formación La Villa.

Fósiles: Hedberg y Sass (1937), mencionan escasos foraminíferos de agua salobre, como *Quinqueloculina fusca* Brady y *Rotalia becarii* Linné. Young (1958), menciona aisladas ocurrencias de *Haplophragmoides*, *Trochammina* y *Bathysiphon* en muestras de pozos.

Edad: Mioceno medio.

Correlación: De acuerdo con Young (*op. cit.*) Formación Los Ranchos correlaciona con la parte superior de la Formación Lagunillas, siendo ésta la correlación generalmente aceptada. Hacia el sur, correlaciona con el Grupo Guayabo sin diferenciar del Zulia suroccidental.

Paleoambientes: Los sedimentos de la Formación Los Ranchos representan un ambiente de lagunas costeras de agua dulce o salobre, con alguna influencia de sedimentación subaérea.

Sinonimias: Los términos en desuso, Formación Los Melones y Formación Arimpia de Garner (1926), se consideran sinónimos de la Formación Los Ranchos.

© **P. Jam L., 1997**

Referencia

Garner, A. H., 1926. Suggested nomenclature and correlation of geological formations in Venezuela. *Amer. Inst. Min. Metall. Eng., Trans.*, p 677-684.

Hedberg, H. D. and L.C. Sass, 1937-a. Sinopsis de las formaciones geológicas de la parte occidental de la Cuenca de Maracaibo, Venezuela, *Bol. Geol. y Min. (Venezuela)*, 1(2-4): 77-120.

Hedberg, H. D. and L.C. Sass, 1937-b. Synopsis of the geologic formations of the western part of the Maracaibo basin, Venezuela, *Bol. Geol. y Min. (Venezuela)*, 1(2-4): 73-112 (English ed.).

Key, C. E., 1960. Estratigrafía del subsuelo de Alturitas. Cong. Geol. Venez. III, Caracas, 1959, Mem., 3: 511-545.

Liddle, R. A., 1928. *The geology of Venezuela and Trinidad*, J P. MacGowan, Fort Worth, Texas, 562 p.

Liddle, R. A., 1946. *The geology of Venezuela and Trinidad*, 2nd. ed., Paleont Res. Inst., Ithaca, New York, 890 p.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela. *Bol. Geol. Publ. Esp.* 1, 728 p. (Ed. en Inglés)

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1970. Léxico Estratigráfico de Venezuela. *Bol. Geol. Publ. Esp.* 4, 756 p.

Quijada E. y A. Caldera, 1987. Geología del Campo Alpuf. Estado Zulia. *VI Cong. Geol. Venez.* Mem. 5: 3318-3352.

Sutton, F. A., 1946. Geology of Maracaibo basin, Venezuela, *Am. Assoc. Petról. Geol., Bull.*, 30(10): 1621-1741.

Young, G. A., 1958. Correlation of the Oligo-Miocene formations in the Districts of Urdaneta and Perijá, State of Zulia. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 1(4): 116-135.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo, 1963. Aspectos de la industria petrolera en Venezuela. Congr. Venez. Petról. I, Caracas, 1962, 850 p. (Cuadro de correlación entre pág. 188-189). reimpreso en: Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról., Bol. Inform., 1963, 6(11); 1964, 7(5).

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)