


**TERCIARIO** (Mioceno Tardío)

Estado Falcón

Referencia original: H. H. Renz, 1948, p. 62.

Renz (1948) estableció el Piso Luciente como unidad cronoestratigráfica en sedimentos de parte de la Formación Pozón del Grupo Agua Salada, en Falcón oriental, y lo definió sólo a base de las zonas y zónulas incluidas. El nombre se deriva del cerro Loma Luca, en la región de Pozón, distrito Acosta, estado Falcón. En la sección tipo, el Luciente es concordante con la parte superior del Piso Araguatiense (Zona de "*Valvulineria*" *herricki*), y está cubierto por alguna unidad bioestratigráfica, no descrita, en la Formación Ojo de Agua, cuya base se caracteriza por una abundancia de oogonios de *Chara*. El espesor del piso en la sección tipo varía entre 739 a 747 metros y abarca la parte superior del Miembro de Arcillas de Huso de la Formación Pozón. En El Mene de Acosta, el espesor sobrepasa los 820 metros, y en Taguaquí, costa norte de Falcón al oeste de Isidro, es probablemente del orden de 1.000 metros.

RENZ reconoció las siguientes divisiones en secuencia ascendente: Zona de *Margilinopsis bassispinosus*, Zona de *Robulus senni*, Zónulas de *Vaginulinopsis superbus*-*Trochammina* cf. *pacifica*, de *Textularia panamensis*, y de *Elphidium poeyanum*—*Reussella spinulosa*. Al norte y este de Pozón, las zonulas no se diferencian de la zona superior.

Sin mencionar el Piso Luciente como tal, Blow (1959) estableció comparaciones entre las zonas y zónulas de Renz y las zonas establecidas a base de foraminíferos planctónicos, según las cuales el Luciente comienza en un nivel alto de la Zona de *Globorotalia mayeri* (Subzona de *G. mayeri*/*Globigerina nepenthes*) y continúa hasta algún nivel dentro de la Zona de *Globigerina bulloides*.

Renz asignó al Luciente una edad que abarca desde el Mioceno Temprano (Zona de *M. bassispinosus*) hasta el Mioceno Medio. Según Blow la zona no se extiende al Mioceno Temprano. De acuerdo con las determinaciones más recientes (Cati *et al.*, 1968) el Piso Luciente correspondería en su totalidad al Mioceno Tardío.

Referencias

Blow, W. H., 1959. Age, correlation and biostratigraphy of the Upper Tocuyo (San Lorenzo) and Pozón formations, eastern Falcón, Venezuela. *Bull. Amer. Paleont.*, 39(178): 67-252.

Cati, F.; M. L. Colalongo; U. Crescenti; S. D'Onofrio; U. Follador; C. Pirini Raddrizzani; A. Pomesano Cherchi; G. Salvarorini; S. Sartorini; I. Premoli Silva; C. F. Wezel; V. Bertolino; G. Bizon; H. M. Bolli; A. M. Borsetti Cati; L. Dondi; H. Feinberg; D. G. Jenkins; E. Perconing, M. Sampo y R. Sprovieri, 1968. Biostratigrafía del Neogeno mediterráneo basada en foraminíferos planctónicos. *Soc. Geol. Ital.*, Boll., 87, 491-503.

Renz, H. H., 1948. Stratigraphy and fauna of the Agua Salada Group, State of Falcón, Venezuela. *Geol. Soc. Amer.*, Mem. 32, p. 219.



1st Ed. English



Comentarios Recibidos


[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)

