

TERCIARIO (Paleoceno Temprano)

Estado Anzoátegui

Referencia original: V. Campos y O, Osuna, 1977, p. 456.

Consideraciones históricas: Campos y Osuna (1977), en su estudio la región de Boca de Uchire, propusieron muchos nombres nuevos para secuencias que afloran en la "faja tectónica piemontina", la "zona de fallas de corrimiento" (Complejo Chacual), "zona volcada" y "zona de buzamientos suaves". Propusieron el nuevo nombre "Formación La Guairita" para designar unos 130 m de intercalaciones de calizas, areniscas y lutitas, con intervalos de ritmitas turbidíticas que afloran en la quebrada La Guairita, afluente del río Chavez, estado Anzoátegui. Las calizas son arenáceas, llegando a verdaderos conglomerados calcáreos, gris azulosos, con fragmentos de cuarzo, ftanita, caliza y conchas de macrofósiles; se destacan las marcas de carga y la gradación vertical. Las lutitas son negras, no calcáreas, no fosilíferas, con fractura de "concha de melón". Las ritmitas, en capas delgadas (menores de 10 cm), se componen de intercalaciones de lutita negra y arenisca de color pardo, de grano fino, calcárea, gradadas, con secuencias "Bouma", marcas de base y abundantes icnofósiles: *Planolites*, *Gordia* y *Dreginozoum*, además del ammonite *Peroniceras* cf. *moureti*, restringido al Coniaciense. El contacto inferior con las "Calizas Albienses", interpretado como discordante, se identifica por unos 30 cm de conglomerados de ftanita, cuarzo y caliza del tipo "Calizas Albienses"; aunque cubierto por aluvión; el contacto superior se interpreta como concordante con la suprayacente "Formación Río Chavez" Campos *et al.* (1980) añadieron que, a 5 m por encima del nivel del ammonite, Bermúdez (*fide* Campos *et al.*, *op. cit.*) identificó a *Globorotalia pseudobulloides*, característico del Paleoceno Temprano. Dada la discrepancia entre edades de los dos fósiles, los autores optaron por considerar que la "formación" pertenece al Paleoceno Temprano y que el ammonite está transportado de niveles mas antiguos. Tomando en cuenta que las ritmitas constituyen aproximadamente la mitad inferior de la "formación" (Campos *et al.*, Figura-19), en contraste significativa con la mitad superior carbonática, mas las dudas sobre la edad real del intervalo, mas las complejidades tectónicas de su afloramiento dentro de la "zona de fallas de corrimiento", el suscrito propone que el término "Formación La Guairita" se mantiene como unidad inválido hasta tanto no se aclara las edades y las relaciones estratigráficas entre la secuencia rítmica y la carbonática.

© G. D. Kiser, 1997

Referencias

Campos, V. y S. Osuna, 1977-a. Geología de la región de Boca de Uchire. Mem., *V Congr. Geol. Venez.*, Caracas, Minis. Energ. y Min., Soc. Venez. Geol., 1: 449-467.

Campos, V. y S. Osuna, 1977-b. Sedimentación y tectónica del frente de montaña y de la faja piemontina de la región de Boca de Uchire-Sabana de Uchire, estado Guárico. *Guía de Excursión No. 5, Mem., V Congr. Geol. Venezolano*, Caracas, Minis. Min. e Hidrocarb., Soc. Venezolana Geol., 5: 159-189.

Campos, V., S. Osuna y V. Vivas, 1980. Geología del borde oriental del frente de montaña de la serranía del Interior, estados Miranda, Guárico y Anzoátegui, Venezuela. *Bol. Geol.*, Minis. Energ. y Min., Caracas, 14(26): 137-196.

Enviar Comentarios





[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)