

TERCIARIO (Mioceno)

Estado Nueva Esparta

Referencia original: P. Jam y M. Méndez Arocha, 1962, p. 80.

Jam y Méndez Arocha (1962) publicaron este nombre para designar sedimentos miocenos en la isla de Margarita, cuya presencia había sido señalada por Woodring (1928), Kugler (1957), Sellier de Civrieux (1959, con el término de "Caliza de Las Marites"), y Taylor (1960), quien los incluyó en la Formación Cubagua. Jam y Méndez Arocha incluyeron en la unidad a los sedimentos miocenos del subsuelo de la isla de Cubagua, que Kugler (1957) había excluido de la Formación Cubagua. Bermúdez (1966) los incluyó en la Formación Cubagua con el nombre informal de "capas de La Tejita", que consideró como posiblemente equivalentes al Miembro Cerro Verde de la Formación Cubagua. El término se conserva provisionalmente con categoría de informal, en vista de lo confuso de sus relaciones estratigráficas.

La unidad aflora típicamente en La Tejita, costa norte de la Laguna de Las Marites, isla de Margarita y ocupa las partes central y sur de Margarita oriental. En la sección tipo Jam y Méndez (1962) describieron un conglomerado basal con cantos de cuarzo, esquistos y rocas ígneas, seguido de arcillas yesíferas amarillas, areniscas arcillosas calcáreas y margas amarillas muy fosilíferas y compactas con *Crassostrea crassissima*, con un espesor total de 45 metros. En la zona de Jagüey Verde (mal escrito "Agua Verde"), afloran 332 metros de calizas, margas y areniscas calcáreas.

Según Jam y Méndez, la unidad es discordante sobre rocas metamórficas y el Grupo Punta Carnero del Eoceno. El contacto superior es discordante con los sedimentos pliocenos de la Formación El Manglillo. Según Taylor (1960), su Formación Cubagua posiblemente suprayace en parte a la Formación La Güica, e infrayace discordantemente a las "arenas de Falca" del Plio-Pleistoceno, unidad que reconoce en lugar de la Formación El Manglillo. Jam y Méndez enumeraron varias especies de moluscos de los géneros *Turritella*, *Chione*, *Corbula*, *Cancellaria*, etc., que indican una posible edad Mioceno Medio a Tardío. Bermúdez (1966) sugirió la correlación de la unidad con el Miembro Cerro Verde de la Formación Cubagua en la isla de Cubagua y la península de Araya, cuya edad es más joven que la indicada por los moluscos de la unidad.

Referencias

Bermúdez, P. J., 1966. Consideraciones sobre los sedimentos del Mioceno Medio al Reciente de las costas central y oriental de Venezuela. Segunda parte. Los foraminíferos bentónicos. *Bol. Geol.*, Caracas, 7(14): 413-611.

Jam, L. P. y M. Méndez A., 1962. Geología de las islas de Margarita, Coche y Cubagua. *Soc. Cienc. Nat. La Salle*, Mem., 22(61): 51-93.

Kugler, H. G., 1957. Contribution to the geology of the islands Margarita and Cubagua, Venezuela. *Geol. Soc. Amer.*, Bull., 68(5): 555-566.

Sellier de Civrieux, J. M., 1959. Apuntes bioestratigráficos sobre una nueva sección del Mioceno en la Isla de Margarita. *Bol. Geol.*, Caracas, 5(10): 81-91.

Taylor, G. C., 1960. Geología de la Isla de Margarita, Venezuela. *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem., II: 838-893.

Woodring, W. P., 1928. Miocene mollusks from Bowden, Jamaica. Part. II. Gastrops and discussion of results. *Carnegie Inst. Washington*, Publ. N° 385, 564.

Enviar Comentarios





[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)