




CRETACICO (Albiense-Coniaciense)

Estado Cojedes

Referencia original: O. Renz y K. C. Short, 1960, P. 284.

Consideraciones históricas: Renz y Short (1960) introdujeron el nombre Formación Mapuey, para designar un conjunto de calizas laminadas y filitas calcáreas, con algunas calizas arenosas, que descansa sobre la Formación Cojedes al oeste de El Tinaco. Bushman (1967) estudió la unidad en detalle, y discutió las secciones de referencia.

Localidad tipo: Renz y Short (*op. cit.*) citaron como localidad tipo el valle del caño Mapuey, a 600 m al norte de la hacienda El Cacao, 9 km al noroeste de San Carlos, distrito San Carlos del estado Cojedes (Hoja 6444, esc. 1:100.000, Cartografía Nacional). Dichos autores dieron como secciones de referencia las siguientes: laderas meridionales del Alto de Cebadilla, 1 km al este de la localidad tipo; ladera septentrional del cerro Bella Vista, a unos 2 km al norte de San Carlos y la del cerro Carrizal, 11 km al oeste de Agua Blanca. Bushman (*op. cit.*) revisó estas secciones, concluyendo que la sección tipo y los del Alto de Cebadilla y el cerro Bella Vista, parecen estar en grandes bloques alóctonos embebidos en las filitas de la Formación Mucaria, más joven. La sección del cerro Carrizal, según este autor, parece ser autóctona, pese a lo confuso de sus contactos, y podría ser designada como localidad tipo.

Descripción litológica: En la sección tipo y en las dos primeras secciones de color referencia, la Formación Mapuey consiste en calizas arenosas color gris, que meteorizan a gris pardusco, laminadas, de grano fino a grueso, interestratificadas con calizas lutíticas y lutitas grises. Hacia la parte superior de la sección tipo hay capas lenticulares, de 10 a 30 cm, de un conglomerado formado por guijarros de 5 a 6 mm de calizas arrecifales. En el Alto de Cebadilla, la formación contiene cantos rodados de 10 a 80 cm de diámetro, de caliza maciza gris muy fosilífera y revestida de una capa de óxido de hierro. En general, las calizas de la Formación Mapuey presentan ligero metamorfismo, con alta recrystalización y destrucción de los fósiles, salvo los restos de equinoides.

Espesor: Debido a las complicaciones estructurales, Renz y Short (*op. cit.*) no pudieron dar el espesor de la formación en su sección tipo, aunque reportaron un espesor de 460 m en la sección del cerro Carrizal, sugiriendo que el espesor total de la unidad pudiera ser el doble.

Extensión geográfica: La unidad aflora desde el área de Agua Blanca, hasta el norte de San Carlos, Cojedes, en los cerros Carrizal, Cacaíto, Alto de Cebadilla y Buena Vista.

Contactos: La Formación Mapuey yace concordantemente sobre la Formación Cojedes. El contacto aflora en el área de Boquerón, 7 km al este-noreste de Agua Blanca. Renz y Short (*op. cit.*) aducen que tal contacto no es claro, sino que parece tener interdigitaciones y repliegues. En el tope, el contacto con la Formación Mucaira aflora en la sección tipo y en las de referencia, y es abrupto (Renz y Short, *op. cit.*). Bushman califica dicho contacto de dudoso, debido a la posible aloctonía del material de Mapuey dentro de la Formación Mucaria.

Fósiles: En las calizas de la formación se han hallado amonites desarrollados aplastados, similares a los reportados de la Formación Carorita (Bushman, 1959) y fragmentos de equinoides. Además de estos fósiles considerados autóctonos de la formación, Renz y Short (*op. cit.*) mencionan que en los guijarros de caliza de los conglomerados, se han hallado *Orbitolina* sp. *Miliolidae*, *Nerinea* sp. caprinidos, corales y algas.

Edad: La edad de la Formación Mapuey se considera cretácico temprano (Albiense).

Correlación: La Formación Mapuey es, probablemente, correlativa de la Formación Carorita del Surco de Barquisimeto, según Bushman (*op. cit.*), quien además, postula una posible correlación con la Formación Tucutunemo y con parte de la Formación Los Cristales. Por otra parte, Renz y Short (*op. cit.*) sugieren una correlación con la Formación Querecual, hacia el este y quizás con la Formación Las Mercedes del Grupo Caracas.

Referencias

Renz, O. y K. C. Short, 1960. Estratigrafía de la región comprendida entre El Pao y Acarigua, Estados Cojedes y Portuguesa. *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem., 1: 277-315.

Bushman, J. R., 1959. Geology of the Barquisimeto area - A summnary report. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 2(4): 65-84.

Bushman, J. R., 1965. Geología del área de Barquisimeto, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 6(11): 3-111.

Bushman, J. R., 1967. Geología de la región entre Agua Blanca y San Carlos, Venezuela. *Bol. Geol.*, Caracas, 8(16): 311-336.

Enviar Comentarios



2a Edicion LEV



Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)