

PRECAMBRICO

Estado Amazonas

Referencia original: Mendoza, V.; L. Moreno; F. Barrios; D. Rivas; J. Martínez; P. Lira; G. Sardi y S. Ghosh, 1977, p. 369.

Consideraciones históricas: Mendoza *et al.* (1977) describe con este nombre a unas rocas intermedias, migmatizadas, moderadamente a intensamente tectonizadas que afloran cerca del Poblado Minicia a orillas del río Orinoco entre Santa Bárbara y San Fernando de Atabapo (Hoja ????, esc. ?????, Cartografía Nacional), en San Sebastián (Río Casiquiare) y en el área Guainía-Río Negro. Martínez (1981) menciona rocas similares en el área de San Carlos de Río Negro y Rivas (1981) las describe con mayor detalle en el área de San Fernando de Atabapo. Olszewski *et al.* (1977) y Barrios *et al.* (1981) las describen como gneises de Minicia y muestran los resultados de determinaciones de edad por métodos radiométricos.

Localidad tipo: No se indica en ninguna de las descripciones. Rivas (1981) menciona que "se localizan en el Caserío y en el caño del mismo nombre" pero no cartografía la unidad como tal sino que la incluye dentro del área de afloramiento del Complejo Casiquiare sin diferenciar del cual es constituyente.

Descripción litológica: Las rocas que afloran cerca del poblado de Minicia muestran buen desarrollo de foliación, de color gris oscuro a negro, recrystalizadas, con desarrollo de textura migmatítica. Rivas (1981) menciona que los pliegues del neosoma son claros y la composición es la de un peleosoma de aspecto gneisico melanocrático rico en biotita y hornablenda y con menores cantidades de granate y epidoto. Las rocas están metamorfizadas a la facies de la anfíbolita.

Espesor: No se menciona en las descripciones.

Extensión geográfica: Mendoza *et al.* (*op. cit.*) indican afloramientos de la unidad en el área de Minicia (río Orinoco), en San Sebastián (río Casiquiare) y en el área de Guainía-Río Negro.

Contactos: Se desconoce las relaciones de campo con otras rocas intrusivas en el área.

Edad: Precámbrico. Gaudette *et al.* (1977) y Olszewski *et al.* (1977) han postulado una edad de 1850 ± 50 m.a. Gaudette *et al.* (*op. cit.*) menciona que de acuerdo a observaciones de campo estas rocas pueden representar el componente más antiguo del basamento en el estado Amazonas.

Correlación: Rivas (*op. cit.*) menciona que estas rocas son muy similares a las migmatitas del Complejo Supremo.

Geoquímica: Las rocas de esta unidad son relativamente altas en CaO, Sr y moderadamente bajas en K₂O, K₂O/Na₂O, MgO, Rb/Sr, K/Rb, Rb.

© J. H. Rios, 1997

Referencias

Barrios, F.; D. Rivas; U. Cordani y K. Kawashita, 1985. Geocronología del Territorio Federal Amazonas. *I Simposium Amazónico*, Puerto Ayacucho 1981. Ministerio de Energía y Minas. Dir. de Geología. Public. Esp. 10: 22-31.

Gaudette, H.; W.Olszewski Jr. y J. Mendoza, 1977. U-Ob zircón ages of the Minicia and Macabana gneisses, Amazonas Territory, Venezuela. *V Cong. Geol. Venezolano*. 2: 527-531.

Martínez, J., 1985. Geología de la Sub-región de San Carlos de Río Negro, Territorio Federal Amazonas, Venezuela. *I Simposium Amazónico*, Puerto Ayacucho 1981. Ministerio de Energía y Minas. Dir. de Geología. Public. Esp. 10: 65-71.

Mendoza V.; L. Moreno; F. Barrios; D. Rivas; J. Martínez; P. Lira; G. Sardi y S. Ghosh, 1977. Geología de la parte norte del Territorio Federal Amazonas, Venezuela (Informe en Progreso) *V Congreso Geol. Venezolano*, 1: 363-404.

Olszewski, Jr., W., H. Gaudette y V. Mendoza, 1977. Rb/sr Geochronology of the basement rocks, Amazonas Territory, Venezuela: A Progress report. *V Cong. Geol. Venezolano*, 2: 519-525.

Rivas, D., 1981. ??????????????????????

Rivas, D., 1985. Geología de la Sub-región Atabapo, Territorio Federal Amazonas, Venezuela. *I Symposium Amazónico*, Puerto Ayacucho, Venezuela, p.122-134.

Enviar Comentarios



**Comentarios
Recibidos**



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)