




CRETACICO (Albiense)

Estado Sucre

Referencia original: Yoris, 1985.

Consideraciones históricas: Este término fue introducido Yoris (1985), para designar parte de la secuencia que Metz (1965) definiese como Formación Cutacual. Su sección tipo se encuentra en el río

Putucual, al este de Casanay, estado Sucre. La litología que la caracteriza consiste de calizas oscuras, en parte glauconíticas, con eventos de corrientes turbidíticas, que les brindan un aspecto característico a nivel macroscópico y microscópico, que las diferencian de las calizas pelágicas de la Formación Querecual suprayacente; se intercalan con lutitas oscuras, y eventualmente alguna capa de chert (Yoris, 1988). Desde los trabajos del Departamento de Geología de la U.C.V., con tesis de Pregrado en la región en 1976-1978, no se ha dispuesto de la información suficiente para poder extender hacia el oeste, las facies del Miembro Putucual. Suprayace concordantemente en su región tipo, al Miembro Chimana Grande, de la Formación Chimana, e infrayace también de forma concordante, a la Formación Querecual. Su edad se restringe al Albiense, y por su posición estratigráfica sobre el Miembro Chimana Grande, debería ubicarse en el Albiense tardío principalmente.

Véase [CHIMANA, Formación](#).

© F. G. Yoris V., 1997

Referencias

Hetz, H. L., 1965. Definition of the Cutacual Formation. *Asoc. Ven. Geol. Min. y Petról.*, Caracas; 8 (4): 107-109.

Yoris, F. G., 1985. Pevisión de la estratigrafía del Cretáceo inferior al sur y este de la Serranía del Interior, Venezuela nororiental. En: Espejo, A.; Rios, J. H. y Bellizzia, N. P. (Eds.) *VI Congreso Geológico Venezolano, Bol. Soc. Ven. Geól.*, Caracas; Memoria 2: 1343-1393.

Yoris, F. G., 1988. Localidades tipo para los miembros de la Formación Chimana en la Serranía del Interior, Venezuela nororiental. *Bol. Soc. Ven. Geól.*, Caracas (En Prensa).

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)