

PRECAMBRICO (?)

Estado Zulia

Referencia original: R. A. Liddle, G. D. Harris y J. W. Wells, 1943, p. 278.

Liddle *et al.* (1943) definieron con el nombre de Serie Sierra de Perijá, al complejo basal de la Sierra de Perijá, que describieron como cuarcitas muy duras, cortadas por diques y vetas de cuarzo blanco, junto con micaesquistos y esquistos gneisoides intrusionados por granito, que afloran en el Caño Grande, afluente del río Cachirí, donde infrayace en contacto de falla a capas de edad devónica. Sutton (1946) acortó el nombre a Serie Perijá, y amplió la descripción del granito. Hea y Whitman (1960) describieron la Serie Perijá en el Caño Grande, compuesta de esquistos biotíticos, muscovíticos, tremolíticos, cuarzofeldespáticos, y metacuarcitas cloríticas, cortados por pequeños diques aplíticos de color rojo naranja y vetas de cuarzo lechoso; señalaron su grado de metamorfismo correspondiente a la facies del esquisto verde. En su columna estratigráfica ubican a la unidad por encima de lo que llamaron "basamento", e infrayacente a la Formación Caño Grande del Grupo Río Cachirí.

El término se considera informal por su definición incompleta y su designación inapropiada.

Referencias

Hea, J. P. y A. B. Whitman, 1960. Estratigrafía y petrología de los sedimentos precertácicos de la parte norte-central de la Sierra de Perijá, Estado Zulia, Venezuela. *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem., I: 351-376.

Liddle, R. A., G. D. Harris y J. W. Wells, 1943. The río Cachirí section in the Sierra Perijá, Venezuela. *Bull. Amer. Paleont.*, 27(108): 273-365.

Sutton F. A., 1946. Geology of the Maracaibo basin, Venezuela: *Am. Assoc. Petrol. Geol. Bull.*, 30(10): 1621-1741.

[Enviar Comentarios](#)**1st Ed. English****Comentarios Recibidos**[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)