




CRETACICO (Albiense Temprano)

Estado Zulia

Referencia original: O. Renz, 1959, p. 7.

Consideraciones históricas: El nombre Piché, fue propuesto por primera vez por Renz (1959) para sustituir el informal de Apón Superior, usado por Rod y Maync (1954) y de caliza con *Trigonia* de la Formación Cogollo de Renz (1956). Su nombre deriva del río Piché, tributario del río Cogollo, estado Zulia.

Localidad tipo: Fue definida por Rod y Maync (*op. cit.*) en el río Cogollo, Renz (1959), da el hipoestratotipo en el Río Piché, a 4 km al suroeste de la sección original en Perijá.

Descripción litológica: Consiste en varios tipos de calizas entre las que se encuentran: fosilíferas del tipo coquina, criptocristalina, de estratificación media a delgada con planes de estratificación ondulados con intercalaciones de color gris oscuro a negro, nodulares con estratificación delgada, nodulares margosas y margas de color gris claro azulado. Por litología, solamente resulta difícil de diferenciar del Miembro Tibú.

En el campo Alpuf está caracterizado por wackestones laminares, intercaladas con mudstones con granos bioclásticos, arena y limolita. Hacia el campo La Paz, se observan cantidades relativamente elevadas de arena y limo, como lo indican Ford y Houbolt (1963) en el pozo P-114.

Espesor: En la sección tipo, Rod y Maync (1954), reportan 70 m. con máximos de 165 m. (?) en el caño Cusare y 145 m en la quebrada La Luna. En el campo Alpuf, Quijada y Caldera (1985) consideran para este miembro, 80 m de espesor.

Extensión geográfica: Se encuentra desde la subcuenca de Machiques, al campo La Paz y plataforma de Maracaibo. No se reconoce hacia los Andes.

Expresión topográfica: Constituyen escarpados prominentes que destacan por sobre la sección fácilmente erosionable del Miembro Machiques.

Contactos: Es concordante en su base con el Miembro Machiques o con el Miembro Guáimaro de la Formación Apón, y en su tope, con la Formación Lisure.

Fósiles: Abundantes lamelibranquios, muy recrystalizados. Se reconocen *Trigonia* y *Exogira*. Renz (1977), señala que en la Quebrada La Luna se observó un amonites del género *Oxitropidoceras* perteneciente al grupo multifidium.

Maync (1956), menciona *Miliollidae* y *Orbitolina cóncava texana* (Roemer).

Edad: Según Renz (1977), el amonites mencionado anteriormente indica una edad Albiense.

Correlación: Correlaciona con la parte superior de la unidad G del Grupo Cogollo de Bartok *et al.* (1981), con la parte inferior de la Formación Aguardiente de los Andes, y Peñas Altas de Renz (1959 y 1977) y de García Jarpa *et al.* (1980).

Paleoambientes: Según Ford y Houbolt (1963), la primera microfacies de Apón formada en la parte inferior de la acción del oleaje, se encuentra en forma típica en las Calizas de Piché.

© Sin Autor, 1997

Referencias

Bartok P., Reijers T. J. A. y Juhasz I., 1981. Lower Cretaceous Cogollo Group, Maracaibo basin, Venezuela: Sedimentology, Diagenesis and Petrophysics. *Am. Assoc. Petr. Geol. Bull.*, 65 (6): 1110-1134.

Ford A. y Houbolt J. J. H. C., 1963. Las microfacies del Cretáceo de Venezuela Occidental. 59 p. Leinden E. J. Brill. International sedimentary Petrological series vol. VI.

García Jarpa R., *et al.*, 1980. Correlación estratigráfica y síntesis paleoambiental del Cretáceo de los Andes venezolanos. Boletín de Geología. República de Venezuela. *Ministerio de Energía y Minas*. 14(26): 3-88.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela (Primera Edición). *Bol. Geol.*, Caracas, Pub. Espec. 1, 664 p.

Renz O., 1959. Estratigrafía del Cretáceo de Venezuela Occidental. *Bol. Geol.* 5(10): 3-48.

Renz O., 1977. The lithologic units of the Cretaceous of western Venezuela: *V Cong. Geol. Ven.*, Mem. 1: 45-58.

Rod, E. y Maync, W., 1954. Revision of Lower Cretaceous stratigraphy of Venezuela. *Am. Assoc. Petr. Geol. Bull.*, 38(2): 193-283.

Quijada E. y A. Caldera, 1987. Geología del Campo Alpuj. Estado Zulia. *VI Cong. Geol. Venez.* Mem. 5: 3318-3352.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Garner, A. H., 1926. Suggested nomenclature and correlation of geological formations in Venezuela. *Amer. Inst. Min. Metall. Eng.*, Trans: 677-684.

Habicht, K., 1960. La sección de El Baño, Serranía de Trujillo, estado Lara, *III Congr. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem., 1: 192-213.

Salvador, A., 1961. Guidebook to the geology of northeastern trujillo, *Soc. Geol. Venez. Occidente* Guidebook 3, 33 p.

Smith, J. E., 1951. The Cretaceous limestone producing areas of the Mara and Maraaaibo Districts, Venezuela, *3th. World Petrol. Cong.*, Pr., Section I (geology), The Hague, p. 56-71.

Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo, 1963. Aspectos de la industria petrolera en Venezuela. *I Congr. Venez. Petról.*, Caracas, 1962, 850 p. (Cuadro de Correlación entre pág. 188-189). Reimpreso en: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol.*, Bol. Inform., 1963, 6(11); 1964, 7(5).

Sutton, F. A., 1946. Geology of the Maracaibo Basin, Venezuela: *Am. Assoc. Petroleum Geologists Bull.*, 30(10): 1621-1741.

Trump, G. W. y Salvador, 1964. Guidebook to the geology of western Táchira. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inf., 25 p.

Enviar Comentarios

	
2a Edicion LEV	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)