




CARBONIFERO-PERMICO

Estado Cojedes

Referencia original: G. Feo Codecido, 1954, p. 114.

Martín Bellizzia (1961) publicó este término para designar la parte más joven del batolito de granito alcalino de El Baúl, que constituye el núcleo del mismo y que había sido distinguido como un tipo de granito en la región por Feo Codecido (1954). Toma su nombre del hato Piñero, ubicado 20 kilómetros al este del pueblo de El Baúl, estado Cojedes, donde tiene su localidad tipo, en los cerros Cordero, Cerro con Monte, Laguna Alta, Corralito. Abarca la porción oriental y suroriental de El Macizo de El Baúl, incluyendo numerosas colinas de escasa elevación dispersas en las cabanas. Está menos extendida que la facies Mata Oscura y representa el menor porcentaje en volumen de las rocas graníticas.

La roca se caracteriza por ser densa, compacta, hipautamórfica, equigranular fina a media, de color rosado salmón moteado de oscuro. En la localidad de Merecure se observan cristales prismáticos de hornablenda barkevikítica de hasta 4 milímetros y piroxeno sódico (aegerina augítica). El arreglo textural, semejante a las facies Mata Oscura y Mogote, muestra cristales bien desarrollados de pertita, ortosa y oligoclasa zonadas, asociadas a nidos o agregados glomérulo-porfídicos de la hornablenda barkevikítica y aegerina augítica, epidoto, alanita y clorita. Las relaciones modales de la roca (Martín Bellizzia, 1961) corroboran el aumento progresivo de los minerales máficos hacia el centro y la disminución del cuarzo.

Según Martín Bellizzia (1961), el estudio de las micro-estructuras, lineaciones, capas de flujo, etc. en los restos erosionales de la masa granítica en Corralito ha permitido reconocer el desarrollo incipiente del arco o cúpula del batolito, cuyo centro o cámara magmática estaría ubicado hacia el noreste; a éste están asociados numerosas apófisis de microgranito, diques de aplita, granofiros, vetas pegmatíticas y xenolitos en las rocas metamórficas del Grupo El Barbasco. El espesor de la facies se estima en unos 6.000 metros. Es gradacional a la facies Mata Oscura y discordante, o fallado, con las rocas del Grupo El Barbasco. Localmente, en la zona de contacto, se hace paralela a la foliación de las metamórficas. Su edad es Carbonífero-Pérmico, en base a determinaciones realizadas en la porción extrema del batolito en la facies Mogote, de 270 ± 10 m.a. (Feo Codecido, 1954). A semejanza de las facies Mata Oscura y Mogote, se correlaciona con los granitos de El Palmar, El Totumo, La Paz, Toas, Bailadores y La Macarena (Colombia).

Véase [EL BAUL, Granito Alcalino de](#).

Referencias

Feo-Codecido, G., 1954. Notas petrológicas sobre formaciones que afloran en la región de El Baúl, Estado Cojedes, *Bol. Geol.*, Caracas, 3(8): 109-121.

Martín Bellizzia, C., 1961. Geología del Macizo de El Baúl, Estado Cojedes. *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem., 4: 1453-1530.

Enviar Comentarios





[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)