


POLICARPIO, Miembro (Formación Pozón)

VALIDO



NEOGENO (Mioceno Medio)

Estado Falcón

Referencia original: H. H. Suter, 1947, p. 2195.

Consideraciones históricas: El término fue introducido por Suter (1947), como Miembro de Arenas Glauconíferas de Policarpio, y descrito por Renz (1948), para designar la unidad inferior de la Formación Pozón. El miembro mide solamente 10 m de espesor, pero es un marcador regional de gran importancia, ya que puede seguirse por una distancia lateral de más de 60 km.

Consiste de unos 6 m de una arcilla fosilífera mal estratificada, irregularmente endurecida, arcilla margosa y arena glauconífera, con concreciones diseminadas de roca ferruginosa glauconífera y de marga consolidada blanca. La parte superior, de 4 m de espesor, consiste de arenas glauconíferas calcáreas y yesíferas, que meteorizan a pardo, con concreciones de marga consolidada amarilla. El término arena glauconífera, según apunta Renz (1948), se refiere a un sedimento muy rico en granos de glauconita, embebidos en una matriz arcillosa o margosa, pero no contiene ningún grano de cuarzo.

En la sección tipo, el Miembro Policarpio es ligeramente discordante sobre la Formación San Lorenzo, pero se hace concordante lateralmente. El contacto superior es concordante con el Miembro Husito, de la misma Formación Pozón. Renz (1948), lo incluye en la parte media de la zona de *Siphogenerrina transversa*, con rica microfauna. Blow (1959), lo coloca en el tope de la zona de *Globigerinatella insueta s.l.*, que corresponde, en términos modernos, a la base del Mioceno Medio, zona de *Globorotalia fohsi peripheroronda* (Díaz de Gamero, 1985b).

© **M. L. Díaz de Gamero, 1997**

(Actualizado por: María Lourdes Díaz de Gamero, agosto 1997)

Referencias

Blow, W. H., 1959. Age correlation and biostratigraphy of the Upper Tocuyo (San Lorenzo) and Pozón formations, eastern Falcón, Venezuela, *Bull. Amer. Paleont.*, 39(178): 67-252.

Díaz de Gamero, M. L., 1985b. Estratigrafía de Falcón nororiental, *VI Congr. Geol. Venez. Mem.*, 1: 454-502.

Renz, H. H., 1948. Stratigraphy and fauna of the Agua Salada Group, State of Falcón, Venezuela, *Geol. Soc. Amer., Mem.*, 32, 219 p.

Suter, H. H., 1947. El Mene de Acosta field, Falcón, Venezuela, *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 31(12): 2193-2206.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Bolli, H. M., 1957-a. The genera *Praeglobotruncana*, *Rotalipora*, *Globotruncana* and *Abathomphalus* in the Upper Cretaceous of Trinidad, *B.W.I. U.S. Nat. Mus., Bull.*, (215): 51-60.

Bolli, H. M., 1957-b. The genera *Globigerina* and *Globorotalia* in the Paleocene-Lower Eocene Lizard Springs Formation of Trinidad, *B.W.I. U.S. Nat. Mus., Bull.*, (215): 61-81.

Bolli, H. M., 1957-c. Planktonic foraminifera from the Oligocene-Miocene Cipero and Lengua formations of Trinidad, *B.W.I. U.S. Nat. Mus., Bull.*, (215): 97-123.

Bolli, H. M., 1957-d. Planktonic foraminifera from the Eocene Navet and San Bernardo formations of Trinidad, *B.W.I. U.S. Nat. Mus., Bull.*, (215): 155-172.

Cati, F.; M. L. Colalongo; U. Crescenti; S. D'Onofrio; U. Follador; C. Pirini Raddrizzani; A. Pomesano Cherchi; G. Salvarorini; S. Sartorini; I. Premoli Silva; C. F. Wezel; V. Bertolino; G. Bizon; H. M. Bolli; A. M. Borsetti Catì; L.

Dondi; H. Feinberg; D. G. Jenkins; E. Perconing, M. Sampo y R. Sprovieri, 1968. Biostratigrafía del Neogeno mediterraneo basata sui foraminiferi planctonici. *Soc. Geol. Ital., Boll.*, 87, 491-503.

Comisión Venezolana de Estratigrafía y Terminología, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela. *Bol. Geol. Publ. Esp. 1*, 728 p.

Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo, 1963. Aspectos de la industria petrolera en Venezuela. *I Congr. Venez. Petról.*, Caracas, 1962, 850 p. (Cuadro de Correlación entre pág. 188-189). Reimpreso en: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol.*, Bol. Inform., 1963, 6(11); 1964, 7(5).

Wheeler, C. B., 1960. Estratigrafía del Oligoceno y Mioceno inferior de Falcón occidental y nororiental, *III Congr. Geol. Venez., Mem.*, 1: 407-465.

Wheeler, C. B., 1963. Oligocene and lower Miocene stratigraphy of western and northeastern Falcón Basin, Venezuela, *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 47(1): 35-68.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)