




JURASICO

Estado Falcón

Referencia original: W. MacDonald, 1968, p. 442.

Consideraciones históricas: El término Formación Pueblo Nuevo fue introducido por MacDonald (1968), para designar un conjunto de rocas arcillosas y arenáceas levemente metamorfizadas en la parte central de la península de Paraguaná, estado Falcón, las cuales habían sido brevemente mencionadas por Kehrer (1937), como capas cretáceas (Caliza La Luna-Cogollo). Feo-Codecido (1971) describió brevemente la unidad, sin usar el nombre de Pueblo Nuevo.

Localidad tipo: La localidad tipo de la formación se encuentra en la Mesa de Cocodite, a unos 3 ó 4 km al oeste de Pueblo Nuevo, península de Paraguaná, distrito Falcón del estado Falcón, (Hoja 6251, esc. 1:100.000, Cartografía Nacional). La unidad aflora en los sectores este y oeste de la mesa, a ambos lados del Plutón Granítico de El Amparo.

Descripción litológica: La Formación Pueblo Nuevo se compone principalmente de filitas limolíticas de color gris oscuro a negro, arcilitas, meta areniscas conglomeráticas, cuarcíticas y feldespáticas y caliza recrystalizada, con restos de amonites. En la porción oeste de los afloramientos, que aparentemente corresponden a la base de la formación, predominan las calizas grises con lentes discontinuos en las filitas. En la porción este, en la posición estratigráfica más alta, predominan las meta-areniscas feldespáticas, expuestas en dos áreas al norte y al sur de un núcleo filítico (MacDonald, *op. cit.*). Intercalados con las meta-areniscas y filitas, se encuentran conglomerados de guijarros de cuarzo blanco, formando capas y lentes. En toda la formación se encuentran capas escasas de ftanita recrystalizada.

Las rocas de la Formación Pueblo Nuevo muestran evidencias de un metamorfismo regional de bajo grado, con desarrollo de esquistosidad y cambios mineralógicos correspondientes, aproximadamente, a la facies del esquistos verde.

MacDonald (*op. cit.*), menciona diques de pórfidos hornabléndico-feldespáticos y cuarzo-feldespáticos en la formación.

Espesor: Según MacDonald (*op. cit.*), el espesor expuesto de la formación es de 2.250 m, de los cuales 750 m corresponden a la porción occidental (inferior), y 1.500 m a la oriental (superior). El espesor total puede exceder los 3.500 m.

Extensión geográfica: Los afloramientos de la Formación Pueblo Nuevo están restringidos al área de la Mesa de Cocodite, en la parte central de la península de Paraguaná.

Contactos: La Formación Pueblo Nuevo yace discordantemente o en contacto de falla, sobre las rocas metamórficas más antiguas de la región (esquistos y gneises). Según MacDonald (*op. cit.*), la formación ha sido intrusionada por el Plutón Granítico de El Amparo. Por otra parte, Feo-Codecido (*op. cit.*), le asigna la edad del granito al Pérmico, y menciona guijarros del mismo granito en los conglomerados de la base de la formación. En el tope, la unidad está en contacto discordante o de falla bajo la Formación Cantaure, del Mioceno.

Fósiles: Kehrer (*op. cit.*), menciona un amonite cretácico típico, sin identificarlo. MacDonald (*op. cit.*), encontró fragmentos de amonites identificados por R. W. Imlay, del Servicio Geológico de Estados Unidos, como *Virgatosphietes* sp., *Subdichotomaceras?* sp., *Subptanites?* sp. y *Orthaspidocoras?* sp. Además, en las calizas se observan estructuras de algas e impresiones de pelecípodos no identificados.

Edad: Según Imlay (citado por MacDonald, *op. cit.*), la edad de la Formación Pueblo Nuevo es Jurásico tardío, más joven que Kimmerigdiense medio, como lo demuestra la presencia del género *Virgatosphinotes*.

Correlación: La formación se correlaciona con la Formación Jipi del Grupo Cocinas, del Jurásico tardío de la península de la Guajira, en Colombia. MacDonald (*op. cit.*), sugirió la posibilidad de correlación con rocas

jurásicas equivalentes al este de la falla de Aruba, o hacia el sureste, en la Cordillera de la Costa. Esta suposición parece confirmarse por el hallazgo hecho por Urbani (1969), de pelecípodos identificados por Kauffman (cf Camero, 1969) como *Exogyra* sp. aff E. Virgula (De France), del Jurásico tardío (Kimmeridgiense), en calizas de la Formación Las Brisas en la Cueva del Indio, La Guairita, al sureste de Caracas (Urbani, 1973).

Paleoambientes: La litología y contenido fosilífero de la unidad sugieren un ambiente marino, probablemente somero, con influencia de sedimentos terrígenos (conglomerados) en la porción inferior.

© P. Jam L., 1997

Referencias

Feo-Codecido, G., 1971. Guía de la Excursión a la Península de Paraguaná, Estado Falcón. *IV Cong. Geol. Venez. Mem., Bol. Geol., Pub. Esp.* 5, 1: 304-315.

Kehrer, L., 1937-a. Algunas observaciones en capas cretáceas y precretáceas de las partes suroeste y central de Venezuela. *Bol. Geol. y Min., Caracas*, 2(2-4): 49-73.

Kehrer, L., 1937-b. Some observations on Cretaceous and Precretaceous beds in the south-western and northern central parts of Venezuela. *Bol. Geol. y Min., Caracas*, 2(2-4): 47-70 (ed. en inglés).

MacDonald, W., 1968. Estratigrafía, estructura y metamorfismo, rocas del Jurásico Superior, Península de Paraguaná, Venezuela. *Bol. Geol., Caracas*, 9(18): 441-458.

Urbani, F., 1969. Primera localidad fosilífera del Miembro Zenda de la Formación Las Brisas: Cueva del Indio, La Guairita, estado Miranda. *Boletín Informativo de la Asociación Venezolana de Geología, Minería y Petróleo*, 12: 446-453.

Urbani, F., 1973. Notas sobre el hallazgo de fósiles en rocas metamórficas de la parte central de la Cordillera de la Costa. *Boletín Informativo de la Asociación Venezolana de Geología, Minería y Petróleo*, 16: 14-53.

Enviar Comentarios

	
2a Edición LEV	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)