




TERCIARIO (Eoceno Temprano)

Estado Lara

Referencia original: N. G. Muñoz J., 1966, p. 141-143.

Consideraciones históricas: Muñoz (1966) empleó este nombre para designar y describir formalmente una unidad que había sido descrita por O. Renz (1960-a, b) como "Intervalo Ferruginoso" y mencionado con este nombre inadecuado por Rod (1960), Caudri (1961) y otros.

Localidad tipo: Quebrada Arriba, al noreste de Humocaró Bajo, Estado Lara, en cortes de carretera a lo largo de las márgenes de la quebrada, por una distancia de 650 metros aguas arriba, desde un punto 100 metros al noroeste del punto donde la quebrada atraviesa la carretera Humocaró-Palichal.

Descripción litológica: La formación se caracteriza por el predominio de rocas ferruginosas chamosíticas en paquetes delgadamente estratificados. La roca es oolítica, con una matriz arcillo-limosa, y es conspicua por su color rojo ladrillo oscuro de meteorización, aun cuando la roca fresca es de color verde oliva. Con los oolitos se interestratifican capas de caliza arrecifal ferruginosa. Los cambios laterales son complejos, debido a la distribución irregular de la facies arrecifal.

Extensión geográfica: Restringida a Lara oeste-central.

Contactos: La Formación Quebrada Arriba suprayace concordantemente a la Formación Humocaró e infrayace lutitas atribuidas provisionalmente a la Formación Paují.

Fósiles: Las calizas contienen una rica fauna de macroforaminíferos que incluyen *Operculinoides* cf. *jennyi*, *Actinosiphon* cf. *barbadensis*, *Pseudophragmina soldadensis* y especies de *Amphistegina*, *Discocyclina*, *Heserostegina*, *Lepidocyclina*; también se mencionan macrofósiles no determinados.

Edad: En las primeras descripciones las faunas habían sido atribuidas erróneamente al Eoceno medio, postulándose la ausencia del Eoceno inferior. Sin embargo, según Caudri (1961) la fauna indica claramente una edad Eoceno inferior, opinión que fue sostenida luego por Muñoz (1966).

Correlación: La unidad es correlativa directa de parte de la Formación Valle Hondo, en particular de los niveles cercanos a la caliza de La Paz en la región adyacente de Trujillo. Hacia el este parece gradar al Miembro Botucal de la Formación Morán.

Rod (1960) señaló una correlación litológica entre las formaciones Quebrada Arriba y Caús, y H. H. Renz (1961) mostró el mismo concepto en un cuadro de correlación, pero la evidencia faunal contradice este criterio.

Referencias

Caudri, C. M. B., 1961. Some remarks on the ferruginous interval in the Eocene section of Humocarobajo, Lara. (Nota técnica). *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 4(9): 285-287.

Muñoz J., N. G., 1966. Descripción de las formaciones Humocaró y Quebrada Arriba en sus localidades tipo de Los Andes de Lara. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 9(5): 137-145.

Renz, H. H., 1961-a. Correlation of geologic formations in Venezuela. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 4(6): 199-203.

Renz, H. H., 1961-b. The Cretaceous-Tertiary and Oligocene-Miocene boundaries in Venezuela: a reply. (Nota técnica). *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 4(8): 259-261.

Renz, O., 1960-a. Remarks on the Barquisimeto Trough. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 3(7): 155-160.

Renz, O., 1960-b. Guía de la excursión C-8. Andes nororientales. Barquisimeto-Barbacoas (Estado Lara). *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem., 1: 93-97.

Rod, E., 1960-a. Notes on submarine sliding northwest of Barquisimeto. *Asoc. Venez. Geol. Min. y Petról.*, Bol. Inform., 3(2): 69-72.

Rod, E., 1960-b. Cross-section Montevideo to Humocarobajo, Barbacoas área, Lara. (Nota técnica). *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform. 3(6): 163-164.



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)