




**TERCIARIO** (Eoceno)

Estado Anzoátegui

**Referencia original:** H. H. Renz, 1962, p. 101.

Debido a la ausencia de foraminíferos índices restringidos, Renz (1962), introdujo este término para designar el intervalo comprendido entre las zonas de *Globorotalia rex* (inferior) y *Globigerina soldadoensis* (superior), del Eoceno Temprano en el río Querecual, estado Anzoátegui. La zona se extiende desde la parte superior extrema de la Formación Vidoño hasta la base de la Formación Caratas. Según Renz: "Lo más conspicuo en esta zona son organismos sin rasgos definidos, en forma de esferas y discos, algunos de los cuales, sin embargo, muestran las estructuras superficiales de los radiolarios. Los radiolarios son muy frecuentes en la Formación Navet del Eoceno Temprano y Medio en la isla de Trinidad". Renz señaló que esta zona de ? *Radiolaria* corresponde a las Zonas de *Globorotalia formosa formosa* y *Globorotalia aragonensis* (parse inferior) de Bolli (1957-b).

**Referencias**

Bolli, H. M., 1957-b. The genera *Globigerina* and *Globorotalia* in the Paleocene-Lower Eocene Lizard Springs Formation of Trinidad, *B.W.I. U.S. Nat. Mus., Bull.*, (215): 61-81.

Renz, H. H., 1962. Stratigraphy and paleontology of the type section of Santa Anita Group and overlying Merecure Group, río Querecual, State of Anzoátegui, northeastern Venezuela. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol.*, Bol. Inform. 5(4): 89-108.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)