


**TERCIARIO** (Mioceno Medio)

Estado Anzoátegui

Referencia original: H. D. Hedberg y A. Pyre, 1944, p. 22.**Consideraciones históricas:** Esta unidad fue descrita originalmente por Hedberg y Pyre (1944), como miembro de la Formación Santa Inés y su nombre fue creado por a Krumboltz (1941, informe inédito)

Posteriormente, Hedberg (1950-a) elevó esta formación al rango de grupo, sin mencionar el nombre de Revoltito. El término fue empleado nuevamente por Mencher *et al.*, (1951, cuadro de correlación), aparentemente como formación del Grupo Santa Inés, donde excluyeron a Cipricual y elevaron a Quiamare al rango de formación. Young *et al.*, (1956), mostraron al Miembro Revoltito en su cuadro de correlación, como la división inferior extrema de la Formación Quiamare; con esta categoría ha aparecido en la literatura posterior (CVET, 1970, tabla de correlación N° 24).

Consiste de lutitas arenáceas y carbonáceas, muy meteorizadas a pardo amarillento, que alternan con niveles arcillosos gris claro, con vetillas de yeso y jarosita; interestratificadas, se hallan capas delgadas de areniscas calcáreas de grano fino, y subconglomerados decimétricos con cantos subredondeados centimétricos, de chert negro, calizas silíceas y areniscas cuarzosas de grano fino, con materia carbonácea e impresiones de plantas en las laminas derivadas del Cretáceo superior. En afloramientos frescos, las lutitas son de color gris oscuro y gris verdoso, con textura jabonosa y localmente contienen capas de carbón dura. Recibió su nombre, de la quebrada homónima al suroeste de la población de Santa Inés. Su espesor es de 610 m (CVET, 1970) y 1000 m según Vivas y Macsotay (1989). Este miembro sólo se conoce del área suboriental de los afloramientos de la Formación Quiamare.

En la secuencia se han hallado moluscos marinos, indicativos de ambiente somero. Este miembro es suprayacente y transicional con la Formación Uchirito; su contacto superior es transicional con los miembros Revoltito-Salomón, de la Formación Quiamare. La diferencia consiste en la disminución de horizontes conglomeráticos, y la virtual desaparición de horizontes fosilíferos (Vivas y Macsotay, 1989). En el campo Quiamare De Sisto (1960) correlacionó el miembro por el electrofacies con el intervalo tope arena F-4/ tope arena F-8 de la Formación Oficina. El ambiente depositacional es marino somero.

Véase [QUIAMARE, Formación](#); [SALOMON, Miembro](#).

© **O. Macotay y V. Vivas, 1997**

(Actualizado por: G. D. Kiser, 7 de marzo de 1997)

Referencias

De Sisto, J., 1960-a. Correlation of the Santa Inés Group in northwestern Anzoátegui. Bol. Inform., *Asoc. Venez. Geol. Min. y Petr.*, Caracas, 3(5): 138-143 y 144-146.

Hedberg, H. D., 1950-a. Geology of the eastern Venezuela basin (Anzoátegui-Monagas-Sucre-eastern Guárico portion), *Geol. Soc. Am., Bull.*, 61(11): 1173- 1216.

Hedberg, H. D. and A. Pyre, 1944. Stratigraphy of northeastern Anzoátegui, Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 28(1): 1-28.

Mencher, E., H. J. Fichter, H. H. Renz, W. E. Wallis, J. M. Patterson and R. H. Robie, 1951. *Geological review*, chapter I, p. 1-75, in Text of papers presented at the National Petroleum Convention, Technical Office of Hydrocarbons, Ministry of Mines and Hydrocarbons, Caracas, Venezuela.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1970. Léxico Estratigráfico de Venezuela. *Bol. Geol. Pub. Esp.* 4, 756 p.

Vivas, V. y O. Macsotay, 1989. "Miembro El Pilar de la Formación Quiamare, ejemplo de Molasa Orogénica Neogena de Venezuela Nororiental. 17 pp., *Jornadas 50 Aniversario Escuela de Geología, Minas y Geofísica*, Mayo, 1988.

Young, G. A., A. Bellizzia, H. H. Renz, F. W. Johnson, R. H. Robie y J. Masvall, 1956. Geología de las cuencas sedimentarias de Venezuela y de sus campos petrolíferos. *Bol. Geol.*, Caracas, Pub. Espec. N° 2, 140 p.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Evanoff, J., 1951. Geología de la región de Altagracia de Orituco, *Bol. Geol.* (Venezuela), 1(3): 237-264.

Garner, A. H., 1926. Suggested nomenclature and correlation of geological formations in Venezuela. *Amer. Inst. Min. Metall. Eng.*, Trans., p. 677-684.

Salvador, A., 1964-b. Proposed simplification of the stratigraphic nomenclature in the Eastern Venezuelan Basin. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 7(6): 153-202.

Senn, A., 1935. Die stratigraphische Verbreitung der Tertiären Orbitoiden, mit spezieller Berücksichtigung ihres Vorkommens in Nord-Venezuela und Nord-Marokko, *Eclog. Geol. Helv.*, 28(1): 51-113, 369-373.

Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo, 1963. Aspectos de la industria petrolera en Venezuela. *I Congr. Venez. Petról.*, Caracas, 1962, 850 p. (Cuadro de Correlación entre pág. 188-189). Reimpreso en: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 1963, 6(11); 1964, 7(5).

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)