

NEOGENO (Mioceno Temprano? a Medio)

Estado Falcón

Referencia original: A. Senn, 1940, p. 1580.

Consideraciones históricas: Senn (1935) describió la "Miogypsinen-Kalk" en las montañas cerca de Riecito, distrito Acosta, de Falcón oriental. Posteriormente (1940), se refiere a la unidad como la caliza con *Miogypsina* de Riecito. Renz (1948), hace corresponder la Caliza de Riecito al Miembro de Arcillas de Huso de la Formación Pozón, y a la Zona de *Marginulinopsis basispinosus* de edad Mioceno Medio-Temprano. Ponte *et al.* (1951), reportan ricos yacimientos fosfáticos en Riecito, y en 1961, presentan un estudio geoeconómico del área. Santeliz (1972), establece una secuencia estratigráfica del Cerro Riecito, desde la superficie a la base, compuesta por aluviones, sedimentos lacustres, calizas arrecifales y calizas fosfáticas en la base. Rodríguez (1968), publica una síntesis del yacimiento fosfático de Riecito.

La definición precisa de la relación de la caliza de Riecito con la Formación Capadare no está definida por los momentos.

Localidad tipo: La sección tipo aflora a ambos flancos del cerro Riecito, distrito Acosta, suroriente del estado Falcón. (Hoja 6448, esc.: 1.100.000, Cartografía Nacional).

Descripción litológica: La unidad consiste en calizas arenosas en la base, fosilíferas y poco consolidadas; calizas fosfáticas gris claro a marrón oscuro, cuarzosas y cavernosas, continuando con calizas arrecifales de color marrón a gris claro, densas, duras y muy fosilíferas. Cierra la secuencia un conjunto de sedimentos lacustres, compuestos por arcillas rojo-amarillentas, arenosas y calcáreas, además de arenas conglomeráticas de colores amarillento, rojizo y marrón claro.

Fósiles: Están presentes moluscos como *Turritella abrupta* y foraminíferos del género *Miogypsina* s.p., *Amphistegina*, s.p., etc.

Edad: Es considerada, según Senn (*op. cit.*), Mioceno Medio en su parte inferior, ya que el género *Miogypsina* sp, no se presenta en depósitos posteriores al Mioceno Temprano (Burdigaliense). De acuerdo con Cati *et al.* (1968), debería considerarse Mioceno Medio (LEV II, 1970).

Correlación: Se correlaciona con el Miembro de Arcillas de Huso de Formación Pozón, (Renz, *op. cit.*).

Importancia económica: La unidad contiene importantes yacimientos fosfáticos, cuya evaluación volumétrica ha sido estudiada en bloques que arrojaron un total de 5.620.189,921 tm de rocas, con alto tenor fosfático (Santeliz, *op. cit.*).

Véase [CAPADARE, Formación](#).

© **Neri La Cruz, 1997**

(Actualizado por: María Lourdes Díaz de Gamero, agosto 1997)

Referencias

Cati, F.; M. L. Colalongo; U. Crescenti; S. D'Onofrio; U. Follador; C. Pirini Raddrizzani; A. Pomesano Cherchi; G. Salvarorini; S. Sartorini; I. Premoli Silva; C. F. Wezel; V. Bertolino; G. Bizon; H. M. Bolli; A. M. Borsetti Cati; L. Dondi; H. Feinberg; D. G. Jenkins; E. Perconing, M. Sampo y R. Sprovieri, 1968. Biostratigrafía del Neogeno mediterraneo basata sui foraminiferi planctonici. *Soc. Geol. Ital., Boll.*, 87, 491-503.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1970. Léxico estratigráfico de Venezuela. *Bol. Geol. Public. Espec.* 4, 756 p.

Ponte R., Luís, 1951. Depósitos fosfáticos del Cerro Riecito, Estado Falcón, *Ministerio de Energía y Minas, Dirección General Sectorial de Minas y Geología, Caracas, Venezuela, Boletín de Geología (Caracas)*, 1(1): 9-37, Venezuela, Journal Article.

Renz, H. H., 1948. Stratigraphy and fauna of the Agua Salada Group, State of Falcón, Venezuela, *Geol. Soc. Amer., Mem.*, 32, 219 p.

Rodríguez, S. E., 1968. Estudio sobre el metamorfismo regional en la Península de Paria, Estado Sucre. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról., Bol. Inform.*, 11(3): 61-88.

Santeliz, Hernan, 1972. Evaluación de reservas de rocas fosfáticas en el Cerro Riecito, Estado Falcón = Evaluation of the reserves of phosphate rocks in Cerro Riecito, Falcón, Venezuela, (publisher unknown), Caracas, Venezuela; *4th Congreso Geológico Venezolano*, Memoria 5, Boletín de geología Publicación Especial 5, p. 2773-2788, Venezuela, Journal Article.

Senn, A., 1935. Die stratigraphische Verbreitung der Tertiären Orbitoiden, *Eclog. Geol. Helv.*, 28(1): 51-113.

Senn, A., 1940. Paleogene of Barbados and its bearing on history and structure of Antillean-Caribbean region, *Am. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 24(9): 1548-1610.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico estratigráfico de Venezuela. *Bol. Geol. Public. Espec.* 1, 728 p.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)