

CRETACICO (Coniaciense) - TERCIARIO (Paleoceno)

Este nombre formacional habría que validarlo, ya que a lo largo del informe se menciona como facies de Río Chavez de la Formación Querecual y en otras partes como Formación Río Chavez de edad Senoniense. Se observa en afloramientos reducidos a lo largo de la carretera del valle del río Marvascual. Se encuentra sólo en la parte inferior de esta formación con capas delgadas de rocas hemipelágicas chérticas, rocas de color blanco-amarillo con diferenciaciones chérticas negras en la parte central de las capas se observan unas laminaciones finas y bioturbaciones. Tiene contacto transicional con la Formación Querecual infrayacente.

RIO CHAVEZ 1: De edad Coniaciense a Maastrichtiense, con un espesor promedio de 60 metros, esta constituida por rocas hemipelágicas silíceas, mudstone silíceo endurecido y carbonáticas de color blanco amarillo a marrón negruzco que meteoriza a colores amarillo y negro. Las capas son delgadas de 0.1 a 0.3 metros de espesor, muy ricas en bioturbaciones lenticulares, están muy finamente laminadas. Las capas silíceas son generalmente chérticas. También se observan capas de calizas hemipelágicas, laminadas, bioturbadas con intercapas de marlitas. Se pueden observar esporádicamente bolsones de areniscas finas de color beige claro, muy bien escogidas.

Se encuentran foraminíferos tales como *Allomorphina halli*, *Allomorphina trochoides*, *Ammodiscus* sp., *Archaeoglobigerina blowi*, *Bolivina incrassata gigantea*, *Bathysiphon* sp., *Dentalina* sp., *Dicarinella canaliculata*, *Dorothyia oxycona*, *Dorothyia bulleta*, *Ellipsoglandulina subnodosa*, *Gaudryina laevigata*, *Gaudryina* sp., *Gavelinella stephensoni*, *Gavelinella* sp., *Globorotalites michelinianus*, *Globigerinelloides* sp, *Globorotalites spineus*, *Globotruncana ventricosa*, *Globotruncana stuartiformis*, *Globotruncana linneiana*, *Globotruncana arca*, *Gayroidinoides nitidus*, *Gyroidinoides goudkoffi*, *Gyroidinoides* sp., *Heterohelix globulosa*, *Heterohelix* sp., *Hedbergella* sp., *Kyphopyxa* sp., *Lenticulina* sp., *Marginotruncana renzi*, *Marginotruncana pseudolinneiana*, *Marginotruncana coronata*, *Marginotruncana* sp., *Nodosaria* sp., *Pleurostomella subnodosa*, *Praebulimina kickapooensis*, *Pseudoparrella* sp., *Pseudotextularia elegans*, *Pullenia cretacea*, *Pullenia* sp., *Rosita fornicata*, *Rugoglobigerina rugosa*, *Rzehakina epigona*; radiolarios y nannoplancton calcáreo representado por *Broinsonia parca*, *Cribrosphaera ehrenbergli*, *Eiffellithus turriseiffelli*, *Gartnerago obliquum*, *Micula staurophora*, *Prediscosphaera cretacea*, *Reinhardtites anthophorus*, *Tetralithus aculeus*, *Tetralithus gothicus*, *Tetralithus trifidus*, *Watznaueria barnesae*, *Watznaueria communis*.

Tiene una paleoprofundidad semejante a la Formación Querecual, podría llegar a ser menos profundo pero con una oxigenación importante.

En río Carinicuao, estado Sucre, es de edad Coniaciense a Maastrichtiense, con un espesor total medido de 70 metros en quebrada La Sabana. La litología esta representada por 10 metros chérticos de color negro, que contiene radiolarios.

El paleoambiente es de plataforma externa a batial superior.

En el sector Cangrejal-río Coicual, estado Sucre, este miembro es resistente a la erosión y está constituido por capas delgadas de rocas muy finas, hemipelágicas, pelitas silíceas o calizas micríticas, ambas facies presentan numerosas bioturbaciones. Las rocas silíceas a menudo son chérticas y por eso son muy frágiles, de color marrón oscuro o negro. Las rocas calcáreas son capas muy regulares de caliza micrítica de color beige a beige oscuro, que meteoriza a beige claro. Las capas de calizas se encuentran separadas por intercapas muy delgadas, máximo 5 centímetros de marlitas del mismo color. Cerca del tope, las calizas se convierten en calizas en calizas margosas.

En el sector limitado al oeste de la falla de Guaruta y al este por aproximadamente Agua Fría Abajo, se puede observar que las calizas vienen encima de las capas chérticas. El espesor relativo de cada facies es variable, pero la facies chértica tiene entre 30 y un máximo de 50 metros, la facies carbonática varia desde unos metros hasta 20 metros. Por todo este sector se observan también dentro del miembro silicohemipelágico, bolsones de areniscas finas, muy bien escogidas, de color beige.

En el sector Cangrejal, cerro El Pato, El Algarrobo, estado Sucre, se presentan rocas hemipelágicas, silíceas y calcáreas, finamente laminadas, con numerosas bioturbaciones. Las rocas son de color blanco amarillento con una meteorización a color marrón oscuro. Las capas son delgadas, muy regulares, 0.15 a 0.3 metros de espesor. Se presentan interestratificaciones de limolitas silíceas y limolitas chérticas de colores gris oscuro y negro que meteorizan a pardo amarillento rojizo y pardo oscuro, con estructuras sedimentarias de laminación paralela y

diferenciaciones diagenéticas. Las facies silíceas están ubicadas en la base del miembro y tienen unos 30 metros de espesor promedio. En el tope aparecen capas calcáreas, cada una con un espesor promedio de 0.25 a 0.30 metros, de color beige claro con intercalaciones de marlita beige.

RIO CHAVEZ 2: De edad Maastrichtiense Tardío a Paleoceno, es un miembro lutítico que aparece topográficamente en forma de depresión, es un conjunto muy homogéneo y monótono de lutitas negras a gris marrón, laminadas, bioturbadas, que meteoriza a gris beige. El espesor aproximado es de 100 metros.

Los foraminíferos están representados por *Bathysiphon* sp., *Bolivina incrassata gigantea*, *Bulimina limbata*, *Dorothyia bulleta*, *Dorothyia oxycona*, *Gansserina gansseri*, *Gaudryina laevigata*, *Gaudryina pyramidata*, *Gavelinella stephensoni*, *Gavelinella henbesti*, *Globotruncana aegyptiaca*, *Globotruncana arca*, *Globotruncana* sp., *Globotruncanella petaloides*, *Globotruncanella stuartiformis*, *Globotruncanella conica*, *Glomospira charoides*, *Hedbergella* sp., *Heterohelix striata*, *Heterohelix* sp., *Lenticulina* sp., *Nodosaria* sp., *Pleurostomella subnodosa*, *Pseudoparella* sp., *Pseudotextularia elegans*, *Pullenia* sp., *Rosita contusa*, *Rugoglobigerina rugosa*, *Rzehakina epigona*; el nannoplancton calcáreo está constituido por *Broinsonia parca*, *Ceratolithoides aculeus*, *Chiasiozygus litterarius*, *Cribrosphaera ehrenbergii*, *Eiffellithus eximius*, *Eiffellithus turriseiffelli*, *Gartnerago obliquum*, *Manivitella pemmatoidea*, *Micula staurophora*, *Parhabdolithus embergueri*, *Prediscosphaera cretacea*, *Reinhardtites anthophorus*, *Tetralithus trifidus*, *Tetralithus aculeus*, *Tetralithus gothicus*, *Watznaueria barnesse*, *Watznaueria biporta*, todos ellos del Cretácico. El conjunto del Paleoceno está representado por *Coccolithus cavus*, *Cruciplacolithus tenuis*, *Neochiasiozygus concinnus*, *Zygodiscus sigmoides* de la zona NP2 de Martini, 1971. *Cruciplacolithus tenuis*, *Ellipsolithus macellus*, *Ericsonia subpertusa*, *Fasciculithus tympaniformis*, *Fasciculithus janli*, *Heliolithus* cf. *riedeli*, *Zygodiscus sigmoides*, de las zonas NP5 a NP8 de Martini, 1971.

En río Carinicuao, estado Sucre, es de edad Maastrichtiense a Paleoceno, con un espesor total aflorante en la quebrada La Sabana de aproximadamente 40 metros. La litología está representada por marlitas de color gris oscuro a negro, a veces con bioturbación.

El nannoplancton calcáreo está representado por *Eiffellithus turriseiffelli*, *Gartnerago obliquum*, *Micula staurophora*, *Watznaueria bamesae*.

El ambiente es de plataforma externa a batial superior.

En el sector Cangrejal-río Coicual, es un miembro lutáceo, constituido por un conjunto importante de pelitas y/o marlitas hemipelágicas, muy finas a menudo nodulosas, bioturbadas, de color gris marrón que meteorizan a otras tonalidades de gris. Presenta bioturbaciones lenticulares, que tienen un color más oscuro que la roca.

Los fósiles están representados por equinodermos; esponjas; braquiópodos; icnofósiles; foraminíferos planctónicos tales como *Abathomphalus* cf. *mayaroensis*, *Archaeoglobigerina blowi*, *Gansserina gansseri*, *Globotruncana arca*, *Globotruncana bulloides*, *Globotruncana aegyptiaca*, *Globotruncana* sp., *Globotruncanella petaloidea*, *Globotruncanella stuarti*, *Globotruncanella conica*, *Hedbergella holmdelensis*, *Hedbergella* spp., *Heterohelix costulata*, *Heterohelix striata*, *Heterohelix* spp., *Pseudoguembelina costulata*, *Pseudotextularia elegans*, *Racemiguembelina fruticosa*, *Rosita* cf. *contusa*, *Rugoglobigerina* cf. *rugosa*, *Rugoglobigerina hexacamerata*, *Rugoglobigerina macrocephala*, también se observó retrabajo de la zona de *Schackeina cabri*; foraminíferos béticos representados por *Allomorphina trochoides*, *Allomorphina halli*, *Ammodiscus cretaceus*, *Arenobulimina dorbignyi*, *Bathysiphon alexanderi*, *Bathysiphon discreta*, *Bathysiphon* sp., *Bolivina incrassata gigantea*, *Bolivina* spp., *Bulimina* cf. *kickapoensis*, *Bulimina limbata*, *Bulimina taylorensis*, *Ceratobulimina* sp., *Dentalina* cf. *Iomeiana*, *Dorothyia* cf. *oxycona*, *Dorothyia* cf. *bulleta*, *Gaudryina* cf. *laevigata*, *Gavelinella sandidgei*, *Gavelinella rubiginosa*, *Gavelinella* sp., *Globorotalites* sp., *Glomospira charoides*, *Gyroidina* sp., *Gyroidinoides globosus*, *Gyroidinoides* cf. *beisseli*, *Gyroidinoides nitidus*, *Gyroidinoides goudkoffi*, *Haplophragmoides* cf. *eggeri*, *Hyperammina* cf. *elongata*, *Lenticulina* cf. *munsteri*, *Lenticulina spisso-costatus*, *Lenticulina* spp., *Lingulina* sp., *Nodosaria* spp., *Nuttalides* cf. *truempii*, *Orthokarstenia ewaldi*, *Palmula* cf. *jarvisi*, *Praebulimina kickapooensis*, *Pullenia* cf. *coryelli*, *Pseudoparella valascoensis*, *Pseudopolymorphina* cf. *cuyleri*, *Recurvoides* cf. *deflexiformis*, *Recurvoides* sp., *Rzehakina epigona*, *Saccammina* cf. *placenta*, *Spiroplectammina spectabilis*, *Spiroplectammina grzybowskii*, *Stensioina* cf. *beccarliformis*, *Stilostomella* sp., *Trochammina* sp.

El nannoplancton calcáreo está representado por *Arkhangelskiella cymbiformis*, *Broinsonia enormis*, *Broinsonia parca*, *Ceratolithoides aculeus*, *Cribrosphaerella ehrenbergii*, *Eiffellithus turriseiffelli*, *Gartnerago obliquum*, *Kamptnerius magnificus*, *Micula murus*, *Micula staurophora*, *Microrhabdulus decoratus*, *Prediscosphaera cretacea*, *Watznaueria bamesee*, *Watznaueria biporta*.

La edad por los fósiles presentes es Campaniense a Paleoceno Tardío. En el sector Cangrejal, cerro El Pato, El Algarrobo, estado Sucre, se presenta como un miembro lutáceo. Es un conjunto monótono de lutitas limosas, nodulosas, gris a gris marrón que meteorizan a gris medio, marrón y pardo amarillento, son finamente laminadas, a menudo calcáreas y localmente presenta interestratificaciones de calizas arcillosas y marlitas nodulosas de color gris oscuro que meteorizan a gris claro, gris verdoso, pardo amarillento y beige. El espesor de este miembro se ubica entre 150 y 200 metros.

Se presentan foraminíferos plácticos tales como *Acarinina primitiva*, *Chiloguembelina midwayensis strombiformis*, *Chiloguembelina* sp., *Globigerina* sp., *Globigerina triloculinoides*, *Globigerinelloides* sp., *Globotruncana arca*, *Globotruncanella* sp., *Globotruncanita stuarti*, *Heterohelix* sp., *Heterohelix striata*, *Morozovella velascoensis*, *Morozovella acuta*, *Morozovella aequa*, *Rosita* cf. *contusa*, *Rugoglobigerina* cf. *rugosa*; foraminíferos béticos representados por *Ammodiscus* sp., *Ammodiscus cretaceus*, *Ammodiscus pennyi*, *Ammosphaeroidina pseudopauciloculata*, *Bolivinoidea Arenobulimina dorbignyi*, *Bolivina incrassata*, *Bolivina midwayensis*, *Bolivinoidea delicatus*, *Bathysiphon* sp., *Bulimina trinitatensis*, *Bulimina midwayensis*, *Conotrochammina whangaia*, *Cribr stomoides* cf. *trinitatensis*, *Dentalina* spp., *Dorothia retusa*, *Gavelinella* sp., *Gavelinella beccariformis*, *Globorotalites* sp., *Glomospira charoides corona*, *Glomospira gordialis*, *Glomospira charoides*, *Gyroidina* sp., *Gyroidinoidea globosus*, *Haplophragmoides walteri*, *Haplophragmoides* cf. *eggeri*, *Haplophragmoides* sp., *Hormosina ovuloides*, *Hormosina ovulum ovulum*, *Lenticulina* spp., *Lituotuba* sp., *Nuttallinella florealis*, *Pullenia* cf. *coryelli*, *Pseudopolymorphina* cf. *cayleri*, *Pseudotextularia elegans*, *Quadrinormina allomorphinoides*, *Recurvoides globosus*, *Recurvoides* sp., *Rzehakina epigona*, *Sacammina rhumbleri*, *Sacammina* sp., *Spiroplectamina spectabilis*, *Stensioina* cf. *beccariformis*, *Tritaxia* cf. *trilatera*, *Trochammina* sp., *Trochamminoides* sp., *Trochamminoides irregularis*.

El nannoplancton calcáreo está representado por *Chiastozygus lifferarius*, *Coccolithus pelagicus*, *Coccolithus cavus*, *Cribr osphaerella ehrembergli*, *Cruciplacolithus tenuis*, *Discoaster gemmeus*, *Discoaster multiradiatus*, *Eiffellithus turriseiffelli*, *Ericsonia subpertusa*, *Fasciculithus tympaniformis*, *Gartnerago obliquum*, *Kamptnerius magnificus*, *Micula staurophora*, *Prediscosphaera cretacea*, *Sphenolithus annarhopus*, *Tetralitus murus*, *Watznaueria barnesae*, *Zygodiscus sigmoides*.

Se le asigna una edad Maastrichtiense a Paleoceno, con ambiente batial medio.

M. Furrer y M. Castro, 1997

Referencias

Furrer, M. y M. Castro, 1997. Nuevas unidades propuestas por AGUASUELOS INGENIERIA sobre datos inéditos de LAGOVEN S.A., en la cuenca oriental de Venezuela. *Bol. Geol.* En prensa.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)