


**PERMO-CARBONIFERO**

Estado Trujillo

Referencia original:

Consideraciones históricas: Liddle (1928) llamó "Serie de Río Momboy" a las rocas paleozoicas expuestas en el valle del río Momboy, cerca de Mendoza en el estado Trujillo, que a su juicio formaban parte de una gran serie que flanquea Los Andes venezolanos, y que sitúa estratigráficamente por encima del núcleo granítico y por debajo de la "Old Red Series".

Pierce (1960) es el primero en utilizar el nombre de Formación Río Momboy al proponer al Grupo Mucuchachí, dividido en las formaciones Río Momboy, Libertad y Remolino, sin descripción de la formación. Pierce *et al.*, (1961) describen la Formación Río Momboy, con localidad tipo en la quebrada Mocojón, afluente del río Momboy, al suroeste de Mendoza Fría, estado Trujillo y le asignan edad Devónico. Arnold (1961) en Garcís y Campos (1972), describe la unidad en detalle y la divide en un miembro inferior de pizarras limolíticas y uno superior de calizas cristalinas. Geólogos de Shell y Creole (1964), concluyen que la división del Grupo Mucuchachí de Pierce es inaplicable porque las formaciones no son cartografiables, recomiendan rango formacional para Mucuchachí y el rechazo de los términos Río Momboy, Libertad y Remolino; consideran inaplicable el término Río Momboy por "su empleo vago y confuso y por lo indefinido de sus límites." García y Campos (1972) proponen mantener el nombre de Formación Río Momboy a base de la diferencia de metamorfismo que presenta con la formación Mucuchachí en una franja paralela al río Momboy; los autores antes mencionados dividen las rocas de la unidad en dos miembros: el Miembro Mocojón, inferior y el Miembro Mendoza, superior, que no corresponden a la división de Arnold, quien incluye calizas en ambos intervalos, las cuales son restringidas por García y Campos (1972) al miembro superior. Benedetto (1982) incluye Río Momboy en la Zona 3 de su zonación tectono-estratigráfica del noroeste de América del Sur, mientras que Bellizzia y Pimentel (1994) le dan categoría de unidad litodémica con el rango de asociación, por lo cual los miembros antes mencionados deben ser sometidos al mismo tratamiento pero con el rango de litodemos.

Localidad tipo: Pierce *et al.*, (1961), designan la localidad tipo en la quebrada Mocojón, afluente del río Momboy y al suroeste de Mendoza Fría, estado Trujillo, Hoja 6043, escala 1:100.000 de Cartografía Nacional.

Descripción litológica: La sección inferior de Río Momboy (Mocojón), consiste predominantemente de filitas biotíticas de color gris plomo que meteorizan en colores verdosos y pardo amarillentos intercaladas con cuarcitas gris verdosas, de grano fino subordinadas; la sección superior (Mendoza) consiste de potentes calizas arenosas fosilíferas y filitas aproximadamente iguales, con cuarcitas laminadas en capas muy delgadas en menor cantidad. La característica más resaltante de este intervalo son las calizas que forman paquetes de más de 50 m. de espesor, y la abundancia de carbonato cálcico en las filitas en toda la sección.

Espesor: Pierce *et al.*, (1961) estiman 2000 m en la localidad tipo; GarcíaA y Campos (1972), indican un espesor total para la Asociación Río Momboy de 3.755 m, distribuidos así: 2450 para la parte inferior (Mocojón) y 1305 m para la parte superior (Mendoza).

Extensión geográfica: La unidad aflora en Los Andes venezolanos en la región del río Momboy, estado Trujillo en una franja de rumbo noreste de unos 33 Kilómetros de longitud y anchura variable entre 500 m y 6 kilómetros.

Expresión topográfica: Donde aparecen importantes espesores de calizas la unidad presenta relieves abruptos, debido a que las capas son verticales.

Contactos: El contacto inferior de la unidad es de falla con los granitos de Valera-La Puerta y Timotes y discordante con la Asociación Sierra Nevada; el contacto superior es discordante con unidades paleozoicas, mesozoicas y terciarias.

Fósiles: No se han reportado fósiles de la sección inferior de la unidad (Mocojón); en la sección superior se ha identificado fauna de braquiópodos, briozoarios y crinoideos (Shell y Creole, 1964).

Edad: De acuerdo a relaciones de campo y al contenido fosilífero, la unidad se considera de edad Permo-Carbonífero.

Correlación: La parte inferior de la unidad (Mocojó) se considera equivalente a Mucuchachí y a los intervalos El Gavilán y El Balcón de la Asociación El Aguila y posiblemente a la parte superior de la Asociación Cerro Azul; la sección superior calcárea (Mendoza), en base a la edad Permo-Carbonífero de la fauna se considera equivalente a la Formación Palmarito y al intervalo Cebolleta de la Asociación El Aguila.

Paleoambiente: La sedimentación de Río Momboy aparentemente se inició en una franja angosta y profunda, con áreas positivas desarrolladas en la Asociación Sierra Nevada del Precámbrico tardío y la Asociación Los Torres del Paleozoico tardío, que suministraron los sedimentos. Los mares del Paleozoico tardío penetraron del Norte, con sedimentación marina somera favorable al desarrollo de calizas.

Sinonimia: "Serie Río Momboy" de Liddle, (1928); Formación Río Momboy de Pierce (1960).

© O. Odreman, 1997

Referencias

Bellizzia A., y N. Pimentel, 1994. Terreno Mérida: Un cinturón alóctono herciniano en la Cordillera de Los Andes de Venezuela. *V Simposio Bolivariano Explor. Petrol.* En las cuencas Subandinas. Mem: 271-295.

Benedetto, J. L., 1982. Las unidades tectono-estratigráficas paleozoicas del norte de Sudamérica, Apalaches del Sur y Noroeste de Africa: Comparación y discusión. *V Cong. Latinoam. Geol.* Buenos Aires, 1: 469-488.

Liddle, R. A., 1928. *The geology of Venezuela and Trinidad*. J. P.: MacGowan, Fort Worth, Texas.

García, R. y V. Campos, 1972. Las rocas paleozoicas en la región de Río Momboy, Estado Trujillo. *I Cong. Geol. Venez.* Mem. 2: 796-805.

Pierce, G. R., 1960. Geología de la Cuenca de Barinas. *III Cong. Geol. Venez.* Mem. 1: 214-273.

Pierce, G. R., C. C. Jefferson Jr. y W. R. Smith, 1961. Fossiliferous Paleozoic localities in Merida Andes, Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 45(3): 342-345.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Arnold, H. C., 1966. Upper Paleozoic Sabaneta-Palmarito sequence of Mérida Andes, Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 50(11): 2366-2387.

Christ, P., 1927. La coupe geologique le long du chemin de Mucuchachí a Santa Bárbara dans les andes venesueliennes. *Eclog. Geol. Helv.*, 20(3): 397-414.

Compañía Shell de Venezuela and Creole petroleum Corporation (1964). Paleozoic rocks of Mérida Andes, Venezuela. *Am. Ass. Petrol. Geol. Bull.*, 48(1): 70-84.

González de Juana, 1951. Introducción a la geología de Venezuela: geología de los andes venezolanos y de la subcuenca del Lago de Maracaibo; las formaciones paleozoicas de Venezuela occidental. *Bol. Geol.*, Caracas, 1(1): 117-139.

Kehrer, L., 1938-a. Algunas observaciones sobre la estratigrafía en el Estado Táchira. *Bol. Geol. y Min*, Caracas, 2(2-4): 44-56.

Kehrer, L., 1938-b. Some observations on the stratigraphy in the states of Táchira and mérida, S. W. Venezuela. *Bol. Geol. y Min*, Caracas, 2(2-4): 44-55.

Kündig, E., 1938. Las rocas precretáceas de los Andes Centrales de Venezuela, con algunas observaciones sobre su tectónica. *Bol. Geol. y Min*. Caracas, 2 (2-3-4): 21-44.

Oppenheim, V., 1937-a. Contribución a la geología de los andes venezolanos. *Bol. Geol. y Min*, Caracas, 1(2-4): 25-45.

Oppenheim, V., 1937-b. Contribution to the geology of the Venezuelan Andes. *Bol. Geol. y Min*, Caracas, 1(2-4): 25-43.

Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petróleo, 1963. Aspectos de la industria petrolera en Venezuela. Congr. Venez. Petról. I, Caracas, 1962, 850 p. (Cuadro de correlación entre pág. 188-189). reimpreso en: Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról., Bol. Infom., 1963, 6(11); 1964, 7(5).

Sutton, F. A., 1946. Geology of Maracaibo basin, Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 30(10): 1.621-1.741.

Enviar Comentarios

	
2a Edicion LEV	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)