




**CUATERNARIO** (Pleistoceno)

Estado Sucre

**Referencia original:** O. Macsotay, 1968-a, p. 64

**Consideraciones históricas:** Macsotay (1968) introdujo el nombre de Formación Río Salado para designar los conglomerados aluviales que desarrollan extensos acantilados lo largo del flanco sur de la

península de Paria, estado Sucre.

**Localidad tipo:** La localidad tipo está ubicada entre los caseríos La Salina y Río Salado, al noroeste de Güiría, en la península de Paria, estado Sucre. Corresponde a la Hoja No 7747, escala 1:100.000, Cartografía nacional.

**Descripción litológica:** Principalmente capas gruesas de conglomerados con estratificación irregular, a veces con estratificación cruzada (L.E.V. 1970). Los conglomerados presentan un tamaño muy variable, entre guijarros y peñones, cementados por arenas rojizas ferruginosas, localmente arcillosas y generalmente micáceas, los cantos son redondeados a subredondeados y raras veces subangulares, de cuarzo, cuarcita, esquistos, gneises y menos frecuentemente caliza.

Localmente hay intercalaciones de lentes alargados de arcillas arenosas compactas de color gris que meteorizan en castaño y rojo moteado. Los sedimentos de arcilla arenosa y los conglomerados de grano fino se encuentran impregnados de material carbonoso de tipo sapropelítico, lo cual parecen indicar para el tipo de la sedimentación, un clima húmedo tropical con charcas y pantanos selváticos (Macsotay, 1968).

**Espesor:** El espesor en la sección tipo se estimó en 200 m, aún cuando el espesor total se desconoce.

**Extensión geográfica:** La unidad se extiende desde su localidad tipo hacia el oeste, en una franja de 1 a 5 km de ancho, por unos 70 km hasta los caseríos de Bohordal y Río Seco al oeste de Yaguarapo.

**Contactos:** Posiblemente recubre discordantemente a las rocas metamórficas y es recubierta por la Formación Mesa. Pasa lateralmente a la Formación Güiría (L.E.V. 1970). Según González de Juana *et al.* (1980), los sedimentos de la Formación Río Salado son transicionales a los sedimentos de la Formación Güiría.

**Fósiles:** En los conglomerados fluviales abundan los bivalvos tales como: *Polymesoda (Cyanocyclas) comparana*, *P. (Cyanocyclas) Hyria*, *P. (Cyanocyclas) Monagasensis*. En las arcillas de los paleosuelos se hallaron gasterópodos como: *Aperostoma (Cyclohidalgia) Traslucidum* (Macsotay, 1969).

**Edad:** En base a las correlaciones la unidad es pleistoceno inferior a medio. González de Juana *et al.* (1980), indican que los sedimentos de la Formación Río Salado se pueden considerar como una facies transicional de carácter aluvial piemontina con los sedimentos de la Formación Güiría.

**Correlación:** La unidad es correlacionable con la Formación Güiría (González de Juana *et al.* 1980). Presenta buena correlación con la fauna fluvial, de edad Pleistoceno temprano-medio, de las formaciones Talparo y Erin de Trinidad (Macsotay, 1968). Macsotay (1977), estableció la correlación de la unidad con las formaciones Chiguana y Cumaná.

**Paleoambientes:** Los sedimentos de la Formación Río Salado indican facies aluviales piemontinas y facies fluviales transicionales a los sedimentos de la Formación Güiría (González de Juana *et al.*, 1980). Los sedimentos de arcilla arenosa y los conglomerados de grano fino, con frecuencia se hallan impregnados de material carbonoso sapropelítico, lo cual parecen indicar para el tiempo de la sedimentación, un clima húmedo-tropical con charcas y pantanos selváticos. Macsotay (1968), indica que la presencia de ciertos bivalvos como *Polymesoda (Cyanocyclas) comparana* y *Polymesoda (Cyanocyclas) monaguensis*, representa una sedimentación fluvial muy cercana a un delta o ambiente estuarino, con predominio de aguas dulces o levemente salobre.

## Referencias

González de Juana, C.; J. Iturralde de Arozena y X. Picard, 1980. *Geología de Venezuela y de sus Cuencas Petrolíferas*. Caracas, Ed. Foninves, 2: 714-715.

Macsoy, O., 1968. Formaciones Cenozoicas de Paria: secciones detalladas, correlaciones paleontológicas y paleoecología. Con descripción de unas especies nuevas. "*Geos*", U.C.V., Caracas, 17: 52-107.

Macsoy, O., 1969. Estudio sobre una fauna de moluscos fósiles de la Formación Río Salado, Península de Paria, Venezuela. *Bol. Inst. Oceanogr.*, Univ. de Oriente. 8(12): 3-12.

Macsoy, O., 1977 . Observaciones sobre el neotectonismo cuaternario en el nororiente venezolano. *Bol. Geol.* (Caracas) Public. Esp. 7(3): 1861-1883.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1970. Léxico Estratigráfico de Venezuela. Segunda Edición. *Bol. Geol.*, Publ. Espec. N° 4, p. 528-529.

Enviar Comentarios

|                                                                                   |                                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |
| <b>2a Edición LEV</b>                                                             | <b>Comentarios Recibidos</b>                                                       |



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)