




TERCIARIO (Mioceno Temprano)

Estado Falcón

Referencia original: H. H. Renz, 1948, p. 45-50.

Renz (1948) estableció esta zona en el Grupo Agua Salada, como subdivisión inferior del piso Acostiense, y la dividió en las zónulas de *Uvigerina gallowayi basicordata*, inferior, y *Planularia venezuelana - Saracenaria senni*, superior. La zona tiene 54 metros de espesor en el Miembro de Arcillas de Menecito de la Formación San Lorenzo. Ha sido mencionada posteriormente por Petters y Sarmiento (1956) en Colombia y por Blow (1956, 1959), quien la correlacionó con partes de sus zonas de *Catapsydrax stainforthi* y *Globigerinatella insueta/Globigerinoides triloba*.

Referencias

Blow, W. H., 1956. Origin and evolution of the foraminiferal genus *ORBULINA* d' Orbigny. *Micropaleontology*, 2(1): 57-70.

Blow, W. H., 1959. Age, correlation and biostratigraphy of the Upper Tocuyo (San Lorenzo) and Pozón formations, eastern Falcón, Venezuela. *Bull. Amer. Paleont.*, 39(178): 67-252.

Petters, V. y S. R. Sarmiento, 1956. Oligocene and Lower Miocene biostratigraphy of the El Carmen-Zambrano Area, Colombia. *Micropaleontology*, 2(1): 7-34.

Renz, H. H., 1948. Stratigraphy and fauna of the Agua Salada Group, State of Falcón, Venezuela. *Geol. Soc. Amer.*, Mem. 32, p. 219.

Enviar Comentarios

	
1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)