


**PRECAMBRICO**

Estados Bolívar y Amazonas

Referencia original: J. H. Ríos, 1972, p. 1771.

Consideraciones históricas: Este termino es introducido por Ríos (1972) para designar a una unidad de rocas de composición granítica, expuestas extensamente al este y al oeste del río Cuchivero, estado

Bolívar, la cual incluyó en su Asociación Ignea Cuchivero. Mendoza (1972) la describe en el área del río Suapure y la incluyó en el Grupo Cuchivero.

Localidad tipo: Ríos (*op. cit.*) menciona la existencia de afloramientos de este granito en los alrededores del poblado de Santa Rosalía, al este del río Cuchivero, de donde toma su nombre (Hoja de Cartografía Nacional N° ?????, Escala 1:100000).

Descripción litológica: Es un granito biotítico, color rosado a gris, de grano fino a grueso, con predominio de la fracción de grano medio a grueso, macizo fanerocrystalino, porfidico, que en zonas restringidas muestra débil foliación. Su composición mineralógica, bastante constante en todas las localidades donde se ha descrito, consiste de cuarzo (35%), biotita como principal componente máfico (5%) y cantidades menores de hornblenda, epidoto, clorita y opacos. Es hipidiomórfico granular, masiva a cataclástica. El cuarzo es anhedral y presenta extinción ondulada. El feldespato potásico ocurre en cristales subhedrales mayores a 1cm, con buen desarrollo del enrejado microclínico. La plagioclasa varía de albita a oligoclasa, es anhédrica a subhédrica con inclusiones de sericita y epidoto. La biotita generalmente de color verde botella, se presenta en cristales euhedrales como hojuelas entre el feldespato. La hornblenda, de color verde, aparece en algunos casos alterada a biotita y clorita.

Extensión geográfica: El Granito de Santa Rosalía aflora extensamente en el valle de los ríos Cuchivero y Guaniamo y soporta las mayores elevaciones de la región. Mendoza (*op. cit.*) lo describe en la cuenca del río Suapure. Se han descrito granitos tipo Santa Rosalía en diversas localidades de la parte norte central del estado Amazonas por Mendoza *et al.* (1977), en el área de San Fernando de Atabapo por Rivas (1985), en la zona de San Carlos de Río Negro por Martínez (1985) y en el área del río Parupa, afluente del río Caroní, por Takeda *et al.* (1989).

Contactos: El Granito de Santa Rosalía es intrusivo en las rocas volcánicas de la Formación Caicara. Mendoza (*op. cit.*) menciona que en el área del río Suapure, el Granito de Parguaza es intrusivo en el Granito de Santa Rosalía.

Edad: En el área del río Cuchivero, Olmeta (1968), determinó una edad de 1120 ± 60 m.a. por el método K/Ar; edad que pudiera corresponder al evento termal Orinoquense o Nickerian. En muestras provenientes del área del río Suapure se obtuvo una edad, por isocrona de Rb/Sr en roca total, de 1.875 m.a. (Hurley *et al.*, 1977). Graudette *et al.* (1977) utilizando el mismo método obtuvo una edad de 1.952 ± 71 m.a. MENDOZA (*op. cit.*) considera que el granito de Santa Rosalía en la región del río Suapure, pertenece a los granitos ricos en potasio del evento Trans-Amazónico, el cual ocurrió hace 1.900 ± 200 m.a.

Correlación: McCandless (1965) consideró comagmáticos a la secuencia volcánica (Formación Caicara) y a los granitos de Cuchivero y de Parguaza, basándose en la composición química de las rocas. Mendoza (*op. cit.*) está de acuerdo con el origen comagmático de las volcánicas de Caicara y el Granito de Santa Rosalía, y excluye al Granito de Parguaza por presentar diferencias de textura, mineralogía y composición química con el Granito de Santa Rosalía. Ríos (*op. cit.*) correlaciona la unidad con el Granito de La Paragua y con la Granodiorita de San Pedro de Las Bocas.

Geoquímica: Se caracterizan por contenidos relativamente altos de SiO_2 , $\text{K}_2\text{O}/\text{Na}_2\text{O}$, Rb/Sr y bajos contenidos de Al_2O_3 , MgO, Ca, Sr, K/Rb.

Importancia económica: La unidad es fuente probable de casiterita, de columbita y de tantalita.

Referencias

- Gaudette, H.; P. Hurley y H. Fairbairn, 1977. U-Pb Zircon ages from the northern Guyana shield, Venezuela. *2 Cong. Latinoam. Geol.*, Caracas. 4: 3045-3047.
- Gaudette, H.; W. Olszewski y V. Mendoza, 1977. U-Pb Zircón ages of the Micinia and Macabana gneisses, Amazonas Territory, Venezuela. *V Cong. Geol. Venez.*, Caracas. 2: 527-536.
- Gaudette, H.; F. Hurley; A. Espejo y E. Dahlberg, 1977. Basamento arqueano al sur del Complejo de Imataca en Venezuela y Surinam. *V Cong. Geol. Venez.*, Caracas. 2: 493-508.
- Hurley, P. M., H. W. Fairbairn, W. Gaudette, H. E., Mendoza, V., Martín Bellizzia, C., y A. Espejo, 1977. Progress report on age dating in the north en Guayana Shield: *Bol. Geol.* 1973, Pub. Esp. 7, 4, 3035-3044.
- McCandless, G. L., 1965. Reconocimiento geológico de la región noroccidental del Estado Bolívar. *Bol. Geol.*, Caracas, 7(13): 19-28.
- Mendoza, V., 1972. Geología del área del río Suapure, parte noroccidental del Escudo de Guayana, Estado Bolívar, Venezuela. *IX Cong. Geol. Inter-Guayanas*, p. 306-338.
- Mendoza V., L. Moreno, F. Barrios, D. Rivas, J. Martínez, P. Lira, G. Sardi y S. Ghosh, 1977. Geología de la parte norte del Territorio Federal Amazonas, Venezuela (Informe en Progreso). *V Cong. Geol. Venez.*, 1: 363-404.
- Olmata, M. A., 1968. Determinación de edades radiométricas en rocas de Venezuela y su procedimiento por el método K/Ar. *Bol. Geol.*, Min. Minas e Hidroc., 10(11): 113-208.
- Rivas, D., 1985. Geología de la sub-región Atabapo, Territorio Federal Amazonas, Venezuela. *I Simp. Amazo.*, Puerto Ayacucho, 12-134.
- Ríos, J. H., 1972. Geología de la región de Caicara, Estado Bolívar. *IV Cong. Geol. Venez.*, 3: 1759-1782.
- Takeda H., P. Lira y C. Sosa, 1989. Estudio petrológico de las rocas ígneas en la región de Carum-Antaban, Estado Bolívar. Mem. 50 Aniv. Esc. Geol. Minas y Geofísica, Universidad Central de Venezuela. *Geos.* 29:238-248.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)