

PRECAMBRICO (?)

Estado Mérida

Referencia original: V. Oppenheim, 1937-a, p 34.

Este término fue introducido por Oppenheim (1937-a, b) para designar gneises biotíticos inyectados por diques de aplita, expuestos en el curso superior del río Santo Domingo, estado Mérida. Según Sutton (1946), estos gneises forman parte del Grupo Iglesias. El término se considera como informal debido a lo indefinido de las relaciones estratigráficas. Es sinónimo de la Formación Sierra Nevada (Bass y Shagam, 1960). Schubert (1968) lo consideró equivalente a su Gneis Bandeado de La Mitisús.

Véase [IGLESIAS, Grupo](#); [LA MITISUS, Gneis Bandeado de](#).**Referencias**

Bass, M. N. y R. Shagam, 1960. Edades Rb-Sr de las Rocas Cristalinas de los andes merideños, Venezuela, Mem., *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1: 377-381.

Oppenheim, V., 1937-a. Contribución a la geología de los Andes Venezolanos, *Bol. Geol. y Min.* (Venezuela), 1(2-4): 23-45.

Oppenheim, V., 1937-b. Contribution to the geology of the Venezuelan Andes. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1(2-4): 25-43.

Schubert, C., 1968. Geología de la Región de Barinitas-Santo Domingo, Andes venezolanos surorientales. *Bol. Geol.*, 5, 9(19): 181-261.

Sutton, F. A., 1946. Geology of Maracaibo, Basin, Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 30(10): 1621-1741.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Kündig, E., 1938-a. Las rocas pre-Cretáceas de los Andes centrales de Venezuela con algunas observaciones sobre su tectónica. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 2(2-4): 21-43

Kündig, E., 1938-b. The Precretaceous Rocks of the central Venezuelan andes with some remarks about the tectonics, *Bol. Geol. y Min.*, (Venezuela), 2(2-4): 21-43. (Ed. en Inglés).

[Enviar Comentarios](#)

	
1st Ed. English	Comentarios Recibidos

[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)