




PALEOZOICO

Distrito Federal

Referencia original: S. Aguerrevere y G. Zuloaga, 1937, p. 12.

Consideraciones históricas: Aguerrevere y Zuloaga (1937) nombran al "granito de Sebastopol" sin describirlo texturalmente, posteriormente los mismos autores (1938) lo denominan

formalmente como "Complejo Basal de Sebastopol" y señalan que forma parte del núcleo de la Cordillera de la Costa. Dengo (1951) y Smith (1952) lo denominan como "Complejo de Sebastopol", el primero dice que es un gneis en parte granítico y lo cartografía en la zona de Los Lechosos - La Mariposa, mientras que el segundo autor lo estudia en su localidad tipo y lo califica como un ortogneis granítico, igualmente ambos autores reafirman su posición como basamento de la secuencia de las rocas metamórficas del Grupo Caracas. Wehrmann (1972) utiliza el nombre de "Complejo Basal de Sebastopol" pero distingue diferencias petrográficas significativas entre los cuerpos de la localidad tipo y el de Los Lechosos - La Mariposa, interpretando al primero como un ortogneis y al segundo esencialmente un paragneis. Pimentel *et al.* (1985) estudian el cuerpo de Los Lechosos - La Mariposa, llamándolo informalmente "Gneis de La Mariposa" como una unidad diferente al gneis de la localidad de Sebastopol, adicionalmente presentan datos geocronológicos. Más recientemente, Ostos (1990, p. 20) utiliza el nombre de "Complejo de Sebastopol", mientras que Beck (1985, p. 294, 1986) lo denomina "Gneis de Sebastopol", que es un nombre más adecuado para esta unidad que posee una litología bastante homogénea.

Localidad tipo: Sitio de Sebastopol en la antigua carretera Caracas - Los Teques, a media distancia entre Las Adjuntas y Los Teques, estado Miranda. Los mejores afloramientos se encontraban en las márgenes del río San Pedro. Hoy el día este sitio corresponde a los barrios El Carite y Tierras Blancas (este último nombre es un topónimo que hace referencia al color blanquecino de esta unidad al estar muy meteorizada).

Descripción litológica: Dengo (1951) lo describe como un gneis de grano fino fuertemente foliado, compuesto de cuarzo, ortosa, microclino, plagioclasa, muscovita y biotita, localmente es de grano más grueso con una estructura de gneis granítico. El carácter de ortogneis de las rocas de esta unidad (al menos de aquellas de la localidad tipo) ha sido aceptado por todos los autores que lo han estudiado.

Wehrmann (1972) lo describe como muy meteorizado, de color blanquecino característico producido por la transformación de los feldespatos y cuarzo, reconoce el desarrollo de grandes porfidoblastos de microclino con tendencia a formar "augen", que a diferencia de la plagioclasa, no están deformados. Hacia los bordes del cuerpo se desarrolla foliación hasta formar un gneis de color verdoso por la presencia de clorita, finamente bandeado, que puede llegar a determinar intercalaciones con esquistos cloríticos y filitas cloríticas. En esta zona se observan venas cloríticas paralelas, o ligeramente discordantes con la foliación regional. En la zona de Los Lechosos, este autor primeramente describe un paragneis (véase el Para-gneis de La Mariposa), pero hacia el sur vuelve a aparecer un gneis parecido al de la localidad tipo, por lo cual deduce que en esta zona el paragneis fue intrusionado por un granito.

Extensión geográfica: Únicamente se conoce el cuerpo de la localidad tipo, de unos 5 por 1,5 km (Smith, 1952). Dengo (1951) y [Wehrmann \(1972\)](#) también cartografían con este nombre al cuerpo de Los Lechosos - La Mariposa, que actualmente se ha separado y se conoce como "Para-gneis de La Mariposa" (Pimentel *et al.*, 1985; Urbani, 1989).

Expresión topográfica: No se ha descrito ninguna expresión diferente al de las unidades adyacentes.

Contactos: Desde las descripciones iniciales se ha considerado discordante por debajo de los metaconglomerados de la Formación Las Brisas del Grupo Caracas.

Edad: El estudio de Hess (1972) presenta los datos de una sola muestra de roca total con muy alta relación Rb/Sr (28,0), de manera que utilizando cualquier relación inicial $87\text{Sr}/86\text{Sr}$ razonable, se puede estimar una edad modelo en el orden de los 425 m.a. (Paleozoico, Ordovícico). Posteriormente Gaudette y Olsewsky (1979, datos reproducidos en Teggins, 1981; Urbani, 1982 y Pimentel *et al.*, 1985) presentan datos de otra muestra, analizada tanto en forma total, como en una submuestra de la misma; con las tres muestras se obtiene una edad de 454 m.a.

Urbani (1989) prefiere utilizar solamente las dos muestras de roca total, lo cual aporta una edad de 424 m.a. (prácticamente igual a los 425 m.a. indicados por Hess, 1972), considerándola preferencial como edad de esta unidad hasta que haya estudios geocronológicos más detallados. Existe una edad K-Ar en muscovita con una edad de 41 ± 2 m.a. (Olmata, 1968)

Correlación: Wehrmann (1972, p. 2099) y Ostos (1990, p. 20) lo correlacionan con el Complejo de El Tinaco.

Geoquímica: Dengo (1951) presenta un análisis químico de componentes mayoritarios, a su vez reproducido en González *et al.* (1980, p. 310).

Importancia económica: En la localidad tipo donde la roca está muy meteorizada se ha explotado a pequeña escala como fuente de "arena" para construcciones civiles.

Sinonimia: Sebastopol, Complejo Basal de; Sebastopol, Complejo de; Sebastopol, Granito de.

Ilustraciones: [Mapa tomado de Smith \(1952\)](#).

Véase [LA MARIPOSA, Para-gneis de](#).

© F. Urbani P., 1997

Referencias

Aguerrevere, S. E. y G. Zuloaga, 1937-a. Observaciones geológicas en la parte central de la Cordillera de la Costa, Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1(2-4): 3-22.

Aguerrevere, S. E. y G. Zuloaga, 1937-b. Geological notes of the central part of the Cordillera de la Costa, Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 2(2-4): 3-22.

Aguerrevere, S. E. y G. Zuloaga, 1938-a. Nomenclatura de las formaciones de la parte central de la Cordillera de la Costa, Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 2(2-4): 281-284.

Aguerrevere, S. E. y G. Zuloaga, 1938-b. Nomenclature of the formations of the central part of the Cordillera de la Costa, Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 2(2-4): 257-260.

Beck, C. 1985. La chaîne Caraïbe au merideien de Caracas: geologie, tectogenese, place dans l'evolution geodynamique Mesozoique-Cenozoique des Caraïbes Meridionales. L'Universite des Sciences et Techniques de Lille, *Tesis de doctorado de estado*, 462 p.

Beck, C. 1986. Geologie de la chaîne Caraïbe su meridien de Caracas (Venezuela). *Soc. Geol. de Nord*, Villeneuve s'Ascq, Francia, Public. no. 14, 462 p.

Dengo, G. 1951. Geología de la región de Caracas. *Bol. Geol.*, Caracas, 1(1): 39-115. Versión en inglés: Geology of the Caracas region, Venezuela. *Geol. Soc. Amer. Bull.*, 64(1): 7-40.1953.

Gaudette, H. E. y W. J. Olsewsky. 1979. Report on the preliminary stages of phase II: radiometric age determinations of basement rocks. *Ministerio de Energia y Minas*, Caracas, informe inédito.

Hess H. H. 1972. Basamento gnéisico, Cordillera de la Costa, Venezuela. *Circular Soc. Venezolana Geólogos*, Caracas, 54: 18. Traducción F. Urbani.

Pimentel de B., N., H. E. Gaudette y W. J. Olsewsky. 1985. Nuevas dataciones en el basamento de la cadena Caribe. *Mem. VI Congr. Geol. Venezolano*, Caracas, 3: 1979-1994.

Smith, R. J. 1952. Geología de la región de Los Teques-Cúa. *Bol. Geol.*, Caracas, 2(6) : 333-406.

Teggin, D. E. 1981. Recopilación de datos radimétricos en venezuela. UCV, Instituto de Geoquímica, *Trabajo de ascenso*, 178 p.

Urbani, F. 1982. Comentarios sobre algunas edades de las rocas de la parte central de la Cordillera de la Costa. *Geos*, UCV, Caracas, (27): 77-84.

Urbani, F. 1989. Observaciones sobre la edad del Gneis de Sebastopol y el Para-gneis de La Mariposa, Distrito Federal. *Geos*, UCV, Caracas, (29): 278-280.

Wehrmann, M. 1972. Geología de la región de Caracas - Colonia Tovar. *Bol. Geol.*, Caracas, Public. esp. 5, 4: 2093-2121.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)

Esta pagina ha sido visitada  veces