




TERCIARIO (Mioceno Medio-Tardío)

Estado Miranda

Referencia original: X. Picard y N. Pimentel, 1968, p. 272.

Consideraciones históricas: Picard y Pimentel (1968) introdujeron este nombre para designar los sedimentos más antiguos expuestos en la cuenca de Santa Lucía-Ocumare del Tuy.

Localidad tipo: La unidad tome su nombre de la región de Siquire. Los autores designaron como sección de referencia a la quebrada Garapa, situada 3 kilómetros al oeste de Santa Lucía, complementada con el tramo de la carretera Santa Lucía-El Placer de Siquire, comprendido entre el paso sobre la quebrada Güere-Güere y el puente sobre la quebrada El Tiesto.

Descripción litológica: La Formación Siquire consiste de areniscas bien estratificadas, intercaladas con limos y lutitas laminares, con algunos conglomerados y una caliza. Las areniscas y conglomerados son líticos de cemento calcáreo y colores entre gris verdoso, gris rosado y crema; las capas individuales tienen espesores entre 20 y 60 centímetros. Son frecuentes las limolitas laminares y lutitas grises astillosas y laminares; en la quebrada El Tiesto hay un desarrollo de 15 metros de lutita. En la parte media la unidad contiene una capa de caliza de unos 30 centímetros de espesor, compuesta de *Hemisinus* fósiles. La unidad se sedimentó en una cuenca lacustre.

Espesor: Se estiman unos 250 metros de espesor para la unidad.

Extensión geográfica: Aflora en la parte norte de la cuenca de Santa Lucía, al este y oeste de Santa Lucía, y al noreste de Santa Teresa, Estado Miranda.

Contactos: Suprayace discordantemente a las rocas metamórficas y es recubierta con discordancia por la Formación Tuy.

Fósiles: La Formación Siquire contiene restos de peces, ostrácodos, gasterópodos y restos de vegetales. Macsotay (1968-b) describió gasterópodos fósiles de la unidad del género *Hemisinus*, con dos especies nuevas: *H. (Sheppardiconcha) picardi* y *H. barloventoensis*.

Edad: Picard y Pimentel (1968) sugirieron su edad Mioceno inferior a medio.

Correlación: La Formación Siquire se correlaciona con la Formación Cumaca de la cuenca del Bajo Tuy (Barlovento).

Referencias

Macsotay, O., 1968-b. Edad y paleoecología de las formaciones Tuy y Siquire a base de su fauna de moluscos fósiles. *Bol. Geol.*, Caracas, 9(19): 297-307.

Picard C., X. y N. Pimentel M., 1968. Geología de la cuenca de Santa Lucía-Ocumare del Tuy. *Bol. Geol.*, Caracas, 10(19): 263-296.



**Comentarios
Recibidos**



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)