


**MESOZOICO** (Cretácico Temprano)

Estado Falcón

Referencia original: Martín Bellizzia, C y J. M. Iturralde de Arozena, 1972.

Consideraciones históricas: Martín B. y Arozena (1972), utilizaron ese nombre, para designar la porción central de la zona máfica-ultramáfica de Paraguaná; y publican un completo estudio petrográfico, geoquímico, estructural, gravimétrico, paleomagnético y geotectónico del cuerpo. En 1960, Martín B. había realizado unas descripciones petrográficas de reconocimiento del mismo. Ese mismo año, Méndez describe brevemente al gabro y posteriormente, Feo-Codecido (1971) publica un resumen sobre las Rocas Igneas Básicas y Ultrabásicas de Paraguaná. Santamaría y Schubert (1974), publican los resultados de los análisis químicos realizados para fines comparativos, y presentan las únicas edades radimétricas disponibles hasta el presente. González de Juana *et al.* (1980), publican un resumen de la información disponible sobre esta unidad.

Localidad tipo: Martín B. y Arozena (1972), no proponen específicamente una localidad tipo, pero mencionan los cerros contiguos Siraba y Capuana, con los mejores afloramientos.

Descripción litológica: El cuerpo de gabro zonado consiste de un núcleo de gabro olivinífero-piroxénico (plagioclasa tipo labradorita-bytownita, olivino, diopsido y kaersutita), que presenta una foliación definida E-O a N60E modificada por un intenso fallamiento; ambos rasgos disminuyen hacia el núcleo más masivo. Este núcleo grada en forma zonada, a un gabro piroxénico-anortosítico foliado y a una anortosita masiva, que se distinguen del gabro olivinífero, por presentar escasos máficos. La roca es de color blanco grisáceo y se halla muy alterada hacia sus bordes y zonas de contacto, con las ultramáficas y con las subvolcánicas. En las facies anortosítica de Capuana, presenta numerosos xenolitos de piroxenita y de peridotitadunita serpentinizadas. En el extremo septentrional del cerro Capuana, hay gran profusión de xenolitos de peridotita y norita del Complejo de Tausabana Ultramáfico El Rodeo y de Basalto del Complejo Subvolcánico de Santa Ana. Feo-Codecido (1971) menciona diques de riolitas e inyecciones aplíticas. El gabro zonado no presenta metamorfismo ni un grado mayor de recristalización.

Ambiente tectónico y petrogénesis: Martín B. y Arozena (1972), postulan que el gabro zonado, proviene del manto cercano a una zona de cresta y que fue arrastrado por diapirismo y en estado pastoso, a la corteza superior, con desarrollo de extensas zonas de cizallamiento, cataclasis y sausrización. Las autoras mencionadas opinan que hay consanguinidad y contemporaneidad genética con el Complejo de Tausabana Ultramáfico El Rodeo, y que el gabro zonado, representa el líquido residual de la cristalización fraccionada del magma original del complejo ultramáfico zonado. Su movilidad, le permitió invadir y arrastrar fragmentos de la roca ultramáfica. Por otra parte, los xenolitos de basalto en la facies Capuana, indican la pre-existencia a profundidad del Complejo Subvolcánico de Santa Ana.

Contactos: El Gabro Zonado de Siraba-Capuana, ocupa la porción central entre el Complejo Subvolcánico de Santa Ana en el oeste, con relación de falla, y el Complejo Ultramáfico de Tausabana-El Rodeo en el este, con el cual guarda relaciones intrusivas. De los tres cuerpos aflorantes es el mayor. El rumbo general de las diaclasas es de N70-80E, con alto buzamiento hacia el norte. Los flancos bajos de los cerros Siraba y Capuana se hallan cubiertos por terrazas miocenas.

Extensión geográfica: El Gabro de Siraba-Capuana ocupa toda la porción alta y los flancos norte, este y sur de los cerros Siraba y Capuana, al norte del poblado de Santa Ana, y el flanco este del cerro Arajo, península de Paraguaná, estado Falcón.

Edad: Santamaría y Schubert (1974), realizaron dataciones radimétricas de roca total por el método K/Ar, en dos muestras de gabro, obteniéndose edades de 118 ± 10 m.a., y 120 ± 11 m.a., lo cual corresponde al Cretáceo Inferior a Medio.

Correlación: Martín B. y Arozena (1972), comparan este gabro zonado, con los gabros alpinos de Canyon Mountain y Line (U.S.A). Santamaría y Schubert (1974), realizan un estudio geoquímico comparativo entre este gabro, y los de Gran Roque, Curazao y Los Monjes.

Referencias

Feo Codecido, G., 1971. Guía de la excursión a la Península de Paraguaná, Estado Falcón, *Bol. Geol.*, Pub. Esp. N° 5, 1: 304-315.

González de Juana, C.; J. M. Iturralde de Arozena y X. Picard, 1980. *Geología de Venezuela y de sus cuencas petrolíferas*, Ed. FONINVES, 1: 362-363.

Martín Bellizzia, C., 1960. Estudio petrográfico de rocas procedentes de los Cerros El Rodeo, Tausabana y Santa Ana, *Bol. Geol.*, Pub. Espec. N° 3, 2: 730-742.

Martín Bellizzia, C. y J. M. Iturralde de Arozena, 1972. Complejo Ultramáfico Zonado de Tausabana- El Rodeo, Gabro zonado de Siraba-Capuana y Complejo Subvolcánico estratificado de Santa Ana, Estado Falcón, *Mem. IV Conf. Geol. Caribe*, p. 337-356.

Méndez, J., 1960. La cromita de paraguaná, estado Falcón, *Bol. Geol.*, Pub. Esp. N° 3, 2: 720-729.

Santamaría, F. y C. Schubert, 1974. Geochemistry and Geochronology of the Southern Caribbean-Northern Venezuela Plate Boundary, *Geol. Soc. Am. Bull.*, 7: 1085-1098.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)