




CRETACICO (Valanginiense - Albienense)

Estados Sucre, Anzoátegui y Monagas

Referencia original: H. D. Hedberg, 1950-a, p. 1185.

Consideraciones históricas: Hedberg (1950-a), introdujo este nombre para abarcar las formaciones de edad Cretácico, infrayacente al Grupo Guayuta (Formación Querecual), en la serranía del interior

oriental. Originamente incluía las formaciones Barranquín, El Cantil y Chimana, un ciclo transgresivo que se inicia con conglomerados y areniscas, seguidas de un intervalo calcáreo, para terminar con predominio lutítico (Hedberg y Pyre, 1944). Rod y Maync (1954), Guillaume *et al.* (1972) introdujeron nuevas formaciones en el grupo. Kugler (1953), extendió el reconocimiento del Grupo Sucre hasta Trinidad.

Rod y Maync (1954, p. Figuras 9 a, b, c y 30) intentaron reemplazar los términos "Formación El Cantil y Formación Chimana" con los de "formaciones Borracha (con su miembro medio García), Valle Grande y Boquerón", y describieron un contacto claramente discordante localmente entre los Grupos Sucre y Guayuta. Estas proposiciones fueron rechazadas por Salvador (1964-a, 174, 173). Rosales (1960) retuvo la terminología de Hedberg (*op. cit.*), asignando el grupo al Barremiense-Albiense.

Metz (1968, p. 281) propuso el nuevo término Formación Cutacual para designar un intervalo euxínico Albiense-Cenomaniense, expuesto en el área de la carretera Casanay-Carapito, que descansa discordantemente por debajo de la Formación San Antonio, y que es equivalente lateral de partes de las Formaciones El Cantil y Chimana.

Guillaume *et al.* (1972) observaron que "La estratigrafía del Grupo Sucre (Cretáceo Inferior) plantea aún problemas importantes, principalmente en torno a la relación entre las formaciones Barranquín y El Cantil". Propusieron un esquema de relaciones que seguía aproximadamente el de Rod y Maync (*op. cit.*) y elevaron los miembros Taguarumo (Barranquín superior) y García (El Cantil basal) al rango de formaciones.

González de Juana *et al.* (1980, p. 273) observaron que, en la Serranía del Interior, el grupo pudiese dividirse en solamente dos formaciones: Barranquín y El Cantil, que en el flanco norte de la serranía, en las formaciones Barranquín, Borracha y Chimana, y que en el flanco sur de la serranía, la Formación El Cantil representaba a Borracha y Chimana, combinadas. Yoris (1985, Figuras-2, 26 y 1343) resumió los diversos esquemas de nomenclatura para el Grupo Sucre y recomendó: 1) utilizar el nombre Formación El Cantil en toda la Serranía del Interior y las islas frente a Puerto La Cruz, incluyendo la unidad Borracha, 2) invalidar el nombre formación Cutacual, 3) bajar a las unidades Borracha, García y Taguarumo al rango de miembros.

La subdivisión en dominios, del Cretácico de la Serranía del Interior oriental, permite subdividir el grupo de la siguiente manera, desde el noroeste al suroeste:

En el dominio archipiélago Guaiquerí-Manare: formaciones Barranquín, Taguarumo, García, Borracha y Chimana (Macsoy, *et al.*, 1986 y Von Der Osten, 1954).

En el Dominio Bergantín-Guanta: formaciones Barranquín, El Cantil, Chimana (Vivas, en prensa ??????).

En el Dominio Caripe: formaciones Barranquín, García, El Cantil, Chimana (Guillaume *et al.*, 1972, Rosales 1976, y Yoris 1985).

En el área de El Pilar-Casanay: formaciones Barranquín, Chuparipal, Borracha, Chimana (Metz, 1968, Yoris, 1985, Macsoy *et al.*, 1985).

En la serranía de Guariquén: formaciones Taguarumo, García, El Cantil (Guillaume *et al.*, 1972).

Véanse [BARRANQUIN, Formación](#); [EL CANTIL, Formación](#); [BOQUERON, Formación](#); [BORRACHA, Formación](#); [CHIMANA, Formación](#); [GARCIA, Formación](#); [PUTUCUAL, Formación](#); [VALLE GRANDE, Formación](#); [TAGUARUMO, Formación](#).

(Actualizado por: G. D. Kiser, 11 de julio de 1997)

Referencias

- Hedberg, H. D., 1950-a. Geology of the Eastern Venezuela basin (Anzoátegui-Monagas-Sucre-Eastern Guárico portion). *Geol. Soc. Amer.*, Bull. 61(11): 1173-1216.
- Hedberg, H. D. y A. Pyre, 1944. Stratigraphy of north-eastern Anzoátegui, Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull. 28(1): 1-28.
- González de Juana, C., J. M. Iturralde de Arosena y X. Javier, 1980. *Geología de Venezuela y de sus cuencas petroleras*. Edic. Foninves, Caracas, 2 Tomos: 1031 p.
- Guillaume, H. A., H. Bolli, J. P. Beckmann, 1972. Estratigrafía del Cretáceo Inferior en la Serranía del Interior, Oriente de Venezuela. *Mem. IV Congr. Geol. Venezolano* (1969), 3: 1619-1659
- Kugler, H. G., 1953. Jurassic to recent sedimentary environments in Trinidad, Vereining. *Schweiz. Petr.-Geol. und -Ing.*, Bull., 20(59), Basel: 27-60.
- Macsotay, O., E. Alvarez, D. Rivas y V. Vivas, 1985. Geotermia Tectónica en la región de El Pilar-Casanay, Venezuela nororiental. *Mem. VI Congr. Geol. Venezolano*, Caracas, 2: 881-917.
- Macsotay, O., V. Vivas, N. Pimentel de B., A. Bellizzia G., 1986. Estratigrafía y tectónica del Cretáceo-Paleógeno de las islas al norte de Puerto La Cruz-Santa Fe y regiones adyacentes. *VI Congr. Geol. Venez.*, (1985), Mem. 10: 7125-7174.
- Metz, H. L., 1968. Stratigraphy and Geologic History of extreme northeastern Serranía del Interior, State of Sucre, Venezuela. *Tr. IVth Caribbean Geol. Conf.*, Trinidad, Trans.: 275-292.
- Rod, E. and W. Maync, 1954. Revision of Lower Cretaceous stratigraphy of Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 38(2): 193-283.
- Rosales, H., 1960. Estratigrafía del Cretáceo-Oaleoceno-Eoceno de la Serranía del Interior, Oriente de Venezuela. *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem., 2: 471-495.
- Rosales, H., 1976. Guía de excursión: Maturín al Muelle de Cariaco (Venezuela nororiental, serranía del interior), estados Sucre y Monagas. *Bol. Geol.*, Caracas, Publ. Esp. 7(2): 467-506.
- Salvador, A., 1964a. Proposed redefinition of the term "Tinajitas" in northeastern Venezuela. *Bol. Inform., Asoc. Venez. Geol. Min. y Petr.*, 7(2): 53-64.
- Von Der Osten, E., 1953-54. Geología de la región de la bahía de Santa Fé, (Estado Sucre), *Bol. Geol. (Venezuela)*, 3(8): 123-211.
- Yoris V., F. G., 1985. Revisión de la Estratigrafía del Cretáceo inferior al sur y este de la serranía del interior, Venezuela nororiental. *VI Congr. Venezolano*, 2: 1343-1393.
- ## Bibliografía de Léxicos Anteriores
- González de Juana, C., H. G. Muñoz y M. Vignali, 1965. Reconocimiento geológico de la parte oriental de Paria. *Asoc. Venez. Geol. Min. y Petrol.*, Bol. Inform., 8(9): 255-279.
- Karsten, H., 1850. Beitrag zur Kenntnis der Gesteine des Nordlichen Venezuela, *Deutsch. Geol. Gesell. Zeit.*, 2: 345-361.
- Liddle, R. A., 1928. *The geology of Venezuela and Trinidad*, J. P. MacGowan, Fort Worth, Texas, 552 p.
- Royo y Gómez, J., 1953. Fósiles del Cretácico Inferior de Venezuela, *Acta Cientif. Venez.*, 4(4): 135-153.

Royo y Gómez, J., 1960. Los vegetales de la Formación Barranquín, Cretácico Inferior del Estado Sucre. *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem., 2: 496-500.

Sievers, W., 1896. Zweite Reise in Venezuela in den Jahren 1892-93, *Geogr. Gesell. Hamburg, Mitt.*, 12: 327 p.

Von Der Osten, E., 1957-a. A Fauna from the Lower Cretaceous Barranquín Formation of Venezuela. *Jour. Paleont.*, 31(3): 571-594, pls. 63-65.

Vivas, V., 1987. Bioestratigrafía del Cretáceo de la región de Bergantín-Santa Inés, Estado Anzoátegui, Venezuela, nororiental. *Bol. Geol.*, Caracas, 16(29): 3-128.

Wall, G. P., 1860. On the geology of a part of Venezuela and Trinidad, *Geol. Soc. London, Quart. Jour.*, 16: 460-470.

Wells, J. W., 1944. Cretaceous, Tertiary, and recent corals, a sponge, and an Algae from Venezuela, *Jour. Paleont.*, 18(5): 429-447.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)