




MESOZOICO (Jurásico Temprano)

Estado Cojedes

Referencia original: C. Martín Bellizzia, 1961.

Consideraciones históricas: Esta designación fue utilizada por Martín (1989) en sustitución del nombre original de Asociación Rioliítica, por ser éste informal (no geográfico). Las Volcánicas de El Baúl, habían sido mencionadas anteriormente por Liddle (1946) y por Bucher (1952), y descritas someramente por Feo-Codecido (1955). Martín (1961), describe en detalle un extenso conjunto de rocas riolíticas, que constituyen la parte inferior de su Grupo Volcánico de Guacamayas, en el macizo de El Baúl, Estado Cojedes. Posteriormente, MacDonald y Opdyke (1974) realizaron varios análisis geocronológicos radimétricos en estas rocas.

Localidad tipo: Martín no designa una localidad tipo especial, pero indica que el flanco septentrional de la fila de Guacamayas, al norte de El Baúl, las filas de El Corcovado y Teresén y el cerro Mendozero, localizados en el macizo central al este de El Baúl, están constituídos casi exclusivamente por esta unidad.

Descripción litológica: Esta formación está compuesta por flujos de lava riolítica, con estructuras perlíticas y de texturas y colores variables, intercaladas con tobas de ceniza, con aglomerados y areniscas tobáceas, con tobas de flujo líticas y cristalinas y localmente con aglomerados volcánicos gruesos. Las unidades piroclásticas engrosan progresivamente hacia el norte, noreste y sureste, en tanto que las lavas adelgazan en la misma dirección. Este hecho permite asumir, que la fuente de suinistro es la parte sur-central del macizo. Basada en el estudio estratigráfico, Martín (1961) reconoce tres episodios volcánicos con sus respectivos equivalentes piroclásticos. Las correspondientes unidades las denominó, de más viejo a más joven: Miembro Corcovado, Miembro Tirado y Miembro La Bandola. Los resultados de los análisis químicos practicados a las riolitas, permiten concluir que las mismas son altas en sílice y bajas en alúmina, magnesio y álcalis, con relación a riolitas normales.

Ambiente tectónico y petrogénesis: Martín (1961) considera que el volcanismo de Guacamayas es post-orogénico y fisural, y que no se halla asociado en tiempo y tectonismo, con el plutonismo granítico de El Baúl. La riolita se presenta además en forma de diques que cortan las sienitas y el borde del Granito de El Baúl.

Extensión geográfica: La Formación Rioliítica Teresen, ocupa todo el flanco norte de la Fila de Guacamayas, y forma las filas de El Corcovado y Teresén y el cerro Mendozero. Se considera que su extensión original era mucho mayor y ha sido considerablemente reducido por erosión.

Contactos: En su base, esta unidad volcánica se encuentra en contacto discordante o de falla con la Formación Cañaote, del Grupo El Barbasco. Su contacto superior es discordante y localmente erosional con la Formación Latita Cuarcifera El Peñon, más joven. El espesor máximo medido en la fila de El Corcovado es de 400 m, que disminuye hasta desaparecer por debajo de los aluviones al sureste del macizo.

Edad: MacDonald y Opdyke (1974), reportaron edades absolutas k/Ar en roca total, entre $192 \pm 3,8$ m.a. y $195 \pm 3,9$ m.a. en la riolita cercana al contacto con el Grupo El Barbasco. La edad corresponde al Jurásico temprano (Liásico).

Correlación: Feo-Codecido (1955) y Martín (1961), correlacionan esta unidad riolítica, con riolitas, y lutitas de la Formación La Quinta, en el Arco de El Totumo, en la sierra de Perijá y en la península de Guajira.

Sinonimia: La denominación original informal de esta formación, la de asociación riolítica, fue corregido por Martín (1989) debido a que el nombre no es geográfico y a que el término asociación, le corresponde una jerarquía estratigráfica superior a grupo.

© P. Moticska N., 1997

Referencias

Bucher, W. H., 1952. Geologic structure and orogenic history of Venezuela, *Geol. Soc. Am.*, Mem. 49, 113 p.

Feo-Codécido, G., 1955. Notas petrológicas sobre formaciones que afloran en la región de El Baúl, Estado Cojedes, *Bol. Geol.* (Venezuela), 3(8): 109-121.

Liddle, R. A., 1946 *The geology of Venezuela and Trinidad*, 2° ed., Paleont. Res. Inst., Ithaca, New York, p. 890.

MacDonald, W. D. y N. D. Opdyke, 1974. Triassic paleomagnetism in northern South America, *Geol. Soc. Am., Bull.*, 58: 208-215.

Martín Bellizzia, C., 1961. Geología del Macizo de El Baúl, Estado Cojedes, *Bol. Geol.*, Publ. Esp. N° 3, 4: 1463-1530.

Martín Bellizzia, C., 1989. ???

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)