


**CRETACICO (Aptiense)**

Colombia

Referencia original: F. B. Notestein, C. W. Hubman y J. W. Bowler, 1944, p. 1.173.

Consideraciones históricas: Notestein *et al.* (1944) utilizaron este nombre en la Concesión Barco de Colombia, para designar la unidad inferior calcárea de la Formación Uribante, hoy invalidada y considerada equivalente a la Formación Apón.

Renz (1959), propone el nombre formal de Miembro Tibú, para sustituir al Miembro Apón Inferior de Rod y Maync (1954) y para el Miembro Caliza Tibú, de la Formación Cogollo de Renz (1956). Este mismo autor le da el rango de formación para la sección equivalente lateral, en el distrito Colón del estado Zulia y los Andes hasta los estados de Trujillo y Lara.

Localidad tipo: La sección tipo fue establecida por Notestein *et al.* (*op. cit.*), en los afloramientos del río Tibú, en la Concesión Barco, Colombia del cual toma su nombre.

Rod y Maync (1954), consideran como la sección más completa, la del caño o quebrada Santa Rosita, al norte del Río Apón. Renz (1959), estableció un hipoestratotipo en Venezuela en el río La Grita, entre las poblaciones de La Quinta y Seboruco, además de otras cuatro secciones complementarias, ubicadas en la quebrada Ururo, Seboruco, páramo de Los Conejos y Peñas Altas.

Descripción litológica: No existe una distribución regular dentro de la secuencia, la cual se presenta bien estratificada. La parte inferior está formada por calizas arenosas, areniscas calcáreas y lutitas y no es rara la presencia de glauconita, mientras que la parte superior es prácticamente calcárea.

Consiste en varios tipos de calizas: cristalina de color gris claro a medio, macizas, bioclásticas (coquinoide) con abundantes microfósiles, criptocristalina, laminar con olor fétido y dolomita. Las capas individuales varían desde 50 cm a varios metros y están interestratificadas con margas de colores más claros. Existen intercalaciones de caliza nodular en los Andes y el piedemonte de Perijá.

Según Renz (1959), el Miembro Tibú mantiene una litología bastante uniforme a través de Venezuela occidental.

En el campo Alpuf, este miembro está caracterizado por calizas tipo mudstones de color gris claro, laminares, que contienen ocasionalmente limolita y arena, con intercalaciones subordinadas de lutitas.

Espesor: En la sección tipo del área de Barco, Notestein *et al.* (*op. cit.*) midieron de 145 a 210 m. Excluyendo la arena basal en pozos de la misma área, los espesores están entre 107-117 m. y en la quebrada Santa Elena, 166 m.

Rod y Maync (*op. cit.*) en varias secciones en Perijá central, encontraron espesores bastante constantes entre 360-380 m en los ríos Yasa, río Negro, Apón y las quebradas Mene y Santa Rosita.

Renz (1959), considera que el espesor varía considerablemente, desde 6 m en las cabeceras del río González (12 km al noreste de Mérida), mientras que en Lara, alcanza unos 300 m.

Para el campo Alpuf en Zulia occidental, Quijada y Caldera (1985) dan 100 m.

Extensión geográfica: Se extiende desde su localidad tipo en la Concesión Barco de Colombia, desde las áreas de Tarra y Río de Oro, hasta los campos de La Paz y Mara y plataforma de Maracaibo, a lo largo de los Andes y continúa hasta los estados Trujillo y Lara, con la posible excepción de una región sobre el Arco de Mérida.

Contactos: El contacto inferior es transicional con la Formación Río Negro o clásticos basales, y se coloca por debajo del primer paquete de calizas.

Según Notestein *et al.* (*op. cit.*), el contacto superior es abrupto con las lutitas del Miembro Mercedes. Rod y Maync (*op. cit.*), consideran que en Perijá, el tope es concordante con el Miembro Machiques, de litología muy

característica.

En los Andes venezolanos infrayace en forma concordante a las lutitas del Miembro Guáimaros.

Hacia Trujillo y Lara, resulta difícil de separar de Guáimaros por el poco espesor y por los numerosos niveles lutíticos presentes dentro de las Calizas de Tibú.

Fósiles: La *Choffatella decipiens* es el fósil característico y más común. Esta especie a veces está acompañada de *Pseudocyclammina*, Miliólidos, Textularidas y *Neotrocholina* cf. *raldensis*. Algunos ejemplares dudosos del género *Trocholina* se hallaron por debajo de la aparición más baja de *Choffatella*, al sur de Curarigua, estado Lara.

Renz (*op. cit.*) describe en el área de Seboruco, entre San Cristóbal y Santo Domingo, los géneros de amonites *Chelonicerias* sp. y *Heminautilus* sp. Existen numerosas especies de lamelibranquios: *Exogyra texana*, *E. Couloni*, *E. boussingaulti*, *Trigonia Tocaiman*, *Cucullacea gabrielis* y los equinoides *Ennallaster* y *Toxaster*.

Edad: La primera aparición de *Choffatella decipiens* en la parte basal, es considerada por Maync (1955) en Ford y Houbolt (1963), como el Hauteriviense Superior-Barremiense Inferior. Según Renz (*op. cit.*), la fauna de Tibú es de edad Aptiense.

Correlación: Corresponde a la parte inferior de la Formación Apón de Sutton (1976) y al miembro inferior de Apón de Rod y Maync (1954), a la unidad H de Bartok *et al.* (1981), a la Formación Tibú de Renz (1959) para los Andes y a la base de la Formación Peñas Altas de Renz (1959) y de García Jarpa *et al.* (1980).

Paleoambientes: La fauna indica un ambiente nerítico, tranquilo y bien aireado.

Importancia económica: Algunos intervalos son productores de petróleo en campos de Perijá y el lago de Maracaibo.

© D. Pérez de Mejía, 1997

Referencias

Bartok, P., T. Reijers, J. Juhasz, 1981. Lower Cretaceous Cogollo Group, Maracaibo Basin, Venezuela; sedimentology, diagenesis, and petrophysics, American Association of Petroleum Geologists, Tulsa, OK, United States, AAPG Bulletin, 65(6): 1110-1134.

Ford A. y J. J. H. C. Houbolt, 1963. Las microfacies del Cretáceo de Venezuela occidental, Leiden, E. J. Brill. *International Sedimentary Petrological series*. 6: 59.

García Jarpa, R., 1980. Correlación estratigráfica y síntesis paleoambiental del Cretáceo de los Andes venezolanos. Boletín de Geología, República de Venezuela. *Ministerio de Energía y Minas*, 19(26): 127-136.

Notestein, F. B., Hubman, C. W. y Bowleer, J. W., 1944. Geology of the Barco Concession, Republic of Colombia, South América. *Geol. Soc. Amer., Bull.*, 55(9): 1165-1216.

Quijada, E. y Caldera, A., 1985. Geología del Campo Alpuf. Estado Zulia. *VI Cong. Geol. Ven.*, Mem. T.V., p. 3318-3350.

Renz, O., 1956. Cretaceous in Western Venezuela and the Guajira (Colombia) *20th Internat. Geol. Cong.*, México City, preprint, 20 p.

Renz, O., 1959. Estratigrafía del Cretáceo de Venezuela Occidental, *Bol. Geol.* 5(10): 3-48.

Rod, E. y Maync, W., 1954. Revision of Lower Cretaceous stratigraphy of Venezuela. *Am. Assoc. Petr. Geol. Bull.*, 38(2): 193-283.

Sutton, F. A., 1946. Geology of the Maracaibo Basin, Venezuela: *Am. Assoc. Petroleum Geologists Bull.*, 30(10): 1621-1741.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

- Garner, A. H., 1926. Suggested nomenclature and correlation of geological formations in Venezuela. *Amer. Inst. Min. Metall. Eng.*, Trans: 677-684.
- González de Juana, C., 1951-a. Introducción al estudio de la geología en Venezuela. Capítulo I: Geología de los Andes venezolanos y de la subcuenca del Lago de maracaibo. Capítulo II: Las formaciones paleozoicas de Venezuela occidental. *Bol. Geol.*, Caracas, 1(1): 117-139.
- González de Juana, C., 1951-b. Introducción al estudio de la geología de Venezuela. Capítulo III: Las formaciones mesozoicas en Los Andes venezolanos y n la subcuenca del Lago de Maracaibo. *Bol. Geol.*, Caracas, 1(2): 195-216.
- González de Juana, C., 1951-c. Introducción al estudio de la geología de Venezuela. Capítulo V: Las formaciones del Eoceno en Los Andes venezolanos y en la subcuenca del lago de Maracaibo. *Bol. Geol.*, Caracas, 1(3): 265-287.
- Habicht, K., 1960. La sección de El Baño, Serranía de Trujillo, estado Lara, *III Congr. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem., 1: 192-213.
- Kehrer, L., 1937-a. Algunas observaciones en capas cretáceas y preretáceas de las partes suroeste y central de Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1(2-4): 49-73.
- Kehrer, L., 1937-b. Some observations on Cretaceous and Pretaceous beds in the southwestern and northern central parts of Venezuela. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1(2-4): 47-70. (ed. en inglés).
- Kugler, H. G., 1953. Jurassic to recent sedimentary environments in Trinidad, Verenig. Schweiz. *Petról. Geol. und Ing.*, Bull., 20(59): 27-60.
- Maync, W., 1949. The foraminiferal genus CHOFATELLA Schlumberger in the Lower Cretaceous (Urgonian) of the Caribbean region (Venezuela, Cuba, México and Florida). *Eclog. Geol. Helv.*, 42: 529-547.
- Mencher, E., Fichter, H. J., Renz, H. H., Wallis, W. E., Renz, H. H. Patterson, J. M. and Robie, R. H., 1953. Geology of Venezuela and its oil fields, *Am. Assoc. Petrol. Geol.*, 37(4): 690-777.
- Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela (Primera Edición). *Bol. Geol.*, Caracas, Pub. Espec. 1, 664 p.
- Renz, H. H., 1961-a. Correlation of geologic formations in Venezuela. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. Inform., 4(6): 199-203.
- Renz, H. H., 1961-b. The Cretaceous-Tertiary and Oligocene-Miocene boundaries in Venezuela: a reply. (Nota técnica). *Asoc. Venez. Geol, Min y Petról.*, Bol. Inform., 4(8): 259-261.
- Renz, O., 1968. Über dir Untergattungen *VENEZOLICERAS* Spath und *LARAICERAS* n. Subgen, deer Gattung *OXYTROPIDOCERAS* Stieler (Ammonoidea) aus den venezolanischen Anden. *Eclog. Geol. Helv.*, 61 (2): 615-655.
- Rod, E., 1959-a. West end of Serranía del Interior, eastern Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 43(4): 772-789.
- Rod, E., 1959-b. Formación Capacho en Trujillo septentrional y en Lara suroriental. *Bol. Geol.*, Caracas, 5(10): 49-66.
- Salvador, A., 1961. Guidebook to the geology of notheastern trujillo, *Soc. Geol. Venez. Occidente* Guidebook 3, 33 p.
- Sievers, W., 1888. Die Kordillere von Mérida, nebst Bermerkungen über das Karibiske Gebirge. *Geogr. Abhand* (Penck), 3(1): 238.
- Sievers, W., 1896. Zweite Reise in Venezuela in den Jahren 1892-1893. *Geogr. Gresell. Hamburg*, Mitt., 12: 327.
- Smith, J. E., 1951. The Cretaceous limestone producing areas of the Mara and Maraaaibo Districts, Venezuela, *3th. World Petrol. Cong.*, Pr., Section I (geology), The Hague, p. 56-71.

Sociedad Venezolana de Ingenieros de Petr3leo, 1963. Aspectos de la industria petr3lera en Venezuela. *I Congr. Venez. Petr3l.*, Caracas, 1962, 850 p. (Cuadro de Correlaci3n entre p3g. 188-189). Reimpreso en: *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petr3l.*, Bol. Inform., 1963, 6(11); 1964, 7(5).

Tomalin, W. G. C., 1938-a. La estratigrafia de las formaciones cret3ceas en las cercanias del valle del R3o Carache, Estado Trujillo, *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 2(2-4): 11-20.

Tomalin, W. G. C., 1938-b. The stratigraphy of the Cretaceous formations in the neighbourhood of the R3o Carache valley, state of Trujillo. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 2(2-4): 11-20. (ed. en ingl3s).

Trump, G. W. y Salvador, 1964. Guidebook to the geology of western T3chira. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petr3l.*, Bol. Inf., 25 p.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)