

TERCIARIO (Oligoceno)

Estado Falcón

Senn (1935, p. 69) subdividió en lutitas de Tacamire y areniscas de Tacamire, a una unidad expuesta cerca del pueblo del mismo nombre en el Distrito Acosta, Estado Falcón. La parte basal, lutítica, suprayace a la caliza de Cerro Campana y parece ser equivalente lateral de las margas de Guayabal (Senn, 1935). La parte superior, arenosa, representa el Miembro La Danta de la Formación Guacharaca. Las lutitas y areniscas combinados equivalen a parte de la Formación Guacharaca.

Véase [GUACHARACA, Formación](#).

Referencias

Senn, A., 1935. Die stratigraphische Verbreitung der Tertiären Orbitoiden, mit spezieller Berücksichtigung ihres Vorkommens in Nord-Venezuela und Nord-Marokko, *Eclog. Geol. Helv.*, 28(1): 51-113 y 369-373.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Liddle, R. A., 1946. *The geology of Venezuela and Trinidad*. 2 ed., Paleont. Res. Inst, Ithaca, N. Y., 890 p.

Renz, H. H., 1948. Stratigraphy and fauna of the Agua Salada Group, State of Falcón, Venezuela. *Geol. Soc. Amer.*, Mem. 32, 219 p.

Suter, H. H., 1947. El Mene de Acosta field, Falcón, Venezuela. *Amer. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 31(12): 2193-2206.

[Enviar Comentarios](#)

	
1st Ed. English	Comentarios Recibidos

[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)