

TERCIARIO (Mioceno Tardío-Plioceno Temprano?)

Estado Anzoátegui

Referencia original: V. Campos, S. Osuna y V. Vivas, 1980.

Campos *et al.*, (1980) proponen este nuevo nombre formacional, tomado del cerro Tucusito, al norte de Valle Guanape, estado Anzoátegui, para designar una secuencia subdividida en dos intervalos: a) uno inferior de 30 m de espesor, caracterizado por el predominio de lutitas, con intercalaciones de capas delgadas de limolitas, y con concreciones ferruginosas; y b) otro superior, de 20 m de espesor, constituido predominantemente por areniscas con intercalaciones de limolitas arcillosas. La unidad descansa sobre la Formación Peñas Blancas y se interpreta un contacto discordante entre ambas unidades (Campos *et al.*, *op. cit.*); la parte superior de la unidad aparece erosionada.

Bermúdez (en Campos *et al.*, *op. cit.*) identifica: *Ammonia tepida* Cushman y *Glomospira gordiales* (Jones y Parquer), lo cual le permite asignar una edad Mioceno o mas joven. Segun Furrer (en Campos *et al.*, *op. cit.*), la fauna le sugiere una edad Mioceno tardío o más joven. Ambos paleontólogos citan la presencia de fauna retrabajada del Oligoceno, Eoceno y Paleoceno. Campos *et al.*, *op. cit.*, proponen una edad Mioceno tardío o mas joven para la Formación Tucusito.

© **M. E. M. 3er Léxico**

Referencias

Campos, V., S. Osuna y V. Vivas, 1980. Geología del borde oriental del frente de montañas de la Serranía del Interior, estados Miranda, Guárico y Anzoátegui. *Bol. Geol.*, Caracas, 14(26): 137-196.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)