




NEOGENO (Mioceno Tardío a Plioceno Temprano)

Estado Falcón

Referencia original: A. L. Payne, 1951, p. 1860.

Consideraciones históricas: Payne (1951) introduce el nombre para designar el miembro superior de la Formación Caujarao en el área de Cumarebo, equivalente lateral del Miembro Corocorote en las secciones en que no está desarrollada la Caliza de Cumarebo ni, consecuentemente, el Miembro Corocorote. Giffuni (1980) describe la secuencia en el área de Tocópero. Giffuni *et al.* (1992) precisan la edad de una unidad, principalmente arcillosa, situada por encima de la Caliza de Cumarebo, a la cual no asignan nombre litoestratigráfico. Díaz de Gamero *et al.* (1997) agrupan los estratos equivalentes a la Caliza de Cumarebo (Miembro Portachuelo según Giffuni, 1980) y la sección por encima de la Caliza de Cumarebo y por debajo de la Formación El Veral (Miembro Turupía según Giffuni, 1980), en la región de Tocópero, y la denominan Formación Turupía.

Localidad tipo: Díaz de Gamero *et al.* (1997) designan como localidad tipo la que aflora a lo largo de la variante occidental de la carretera principal a Coro, desde las cercanías de El Perú hasta 2 km al sur de Tocópero.

Descripción litológica: La Formación Turupía consiste de una secuencia de arcillitas marrón verdosas, calcáreas y muy microfosilíferas, interestratificadas con calizas, relativamente frecuentes en la parte inferior, con capas entre 2 y 3 m de espesor y más escasas hacia arriba, en capas de 0,8 a 1,2 m de espesor, de color marrón grisáceo a rojizo, bioclásticas, con predominio de fragmentos de algas y de moluscos. Petrográficamente, las calizas son en su mayoría granulares ("grainstones"), con algunas granulares con lodo ("packstones").

Espesor: En la sección de Mampostal, el espesor es de 618 m, mientras que en la sección de Tocópero, donde no existe la Caliza de Cumarebo, el espesor alcanza unos 800 m (Díaz de Gamero *et al.*, 1997).

Contactos: En la sección de Mampostal, al oeste, la base de la Formación Turupía se coloca en el tope de la última caliza masiva típica de la Caliza de Cumarebo, encima de la cual dominan las arcillitas. El tope se coloca en la base de la primera limolita calcárea típica de la Formación El Veral. En la sección de Tocópero, al este, la base de la Formación Turupía se coloca en la base de la primera caliza, encima de la espesa secuencia de arcillitas, con algunas areniscas intercaladas pertenecientes a la Formación Agua Salada. El tope, al igual que en la sección anterior, se coloca en la base de la primera limolita calcárea de El Veral. Todos los contactos, tanto inferiores como superior, son concordantes (Díaz de Gamero *et al.*, 1997).

Fósiles: Giffuni (1980) indica que las arcillitas son muy microfosilíferas, con variedad de foraminíferos bénticos y planctónicos, mostrando la distribución de los mismos en la unidad. Las calizas de la parte inferior contienen mayormente fragmentos de algas calcáreas y moluscos, con foraminíferos planctónicos muy frecuente y cirrípedos, equinoideos y foraminíferos bénticos comunes. Las calizas superiores muestran un predominio de fragmentos de moluscos y equinoideos, con frecuentes algas calcáreas, foraminíferos planctónicos, briozoarios, ciertos foraminíferos bénticos y cirrípedos.

Edad: Díaz de Gamero *et al.* (1997) establecen la edad de la Formación Turupía como Mioceno Tardío a Plioceno Temprano, abarcando, en términos de foraminíferos planctónicos, las zonas de *Globorotalia humerosa* a *Globorotalia margaritae* de Bolli y Saunders (1985), N17 a N18 de Blow (1969) y, en términos de nannoplancton calcáreo las zonas de *Discoaster quinquaramus* a *Reticulofenestra pseudoumbilica*, NN11 a NN15 de Martini (1971).

Correlación: La Formación Turupía es, en parte, equivalente lateral de la Caliza de Cumarebo. Díaz de Gamero *et al.* (1997) correlacionan la Formación Turupía con la parte más superior de la Formación Caujarao en su localidad tipo, cuando no está presente la Caliza de Cumarebo, y con parte de la Formación La Vela.

Paleoambientes: Según Giffuni *et al.* (1992) se depositó mayormente en el talud superior y corresponde a un sistema de alto nivel (HST).

(Actualizado por: María Lourdes Díaz de Gamero, agosto 1997)

Referencias

Blow, W. H., 1969. Late Middle Eocene to Recent plactonic foraminiferal biostratigraphy, *I International Conference on Planktonic Microfossils*, proc., 1: 199-422.

Bolli, H and Saunders, J.B., 1985. Oligocene to Holocene low latitude plactic foraminifera en Bolli, H.M., Saunders, J.B. and Perch-Nielsen, K. (eds) (1985) *Plankton Stratigraphy*. Cambridge Earth Science Series. p: 155-262.

Díaz de Gamero, M. L., G. Giffuni y M. Castro Mora, 1997. Las formaciones Caujarao y Turupía al este de Cumarebo, Falcón nororiental, *Sociedad Venezolana de Geólogos*, Bol., 22(1).

Giffuni, G., 1980. Geología del área de Tocópero y su relación con la cuenca de Agua Salada, estado Falcón, *Trabajo Especial de Grado, Universidad Central de Venezuela*, 245 p., Inédito.

Giffuni, G., M. L. Díaz de Gamero y M. Castro Mora, 1992. Análisis secuencial del Neógeno de la región de Cumarebo, Falcón nororiental, basado en estudios bioestratigráficos, *Soc. Venez. Geol.*, Bol., 46: 7-15.

Payne, A. L., 1951. Cumarebo oil fields, Falcón, Venezuela, *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 35(8): 1850-1878.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Cati, F.; M. L. Colalongo; U. Crescenti; S. D'Onofrio; U. Follador; C. Pirini Raddrizzani; A. Pomesano Cherchi; G. Salvarorini; S. Sartorini; I. Premoli Silva; C. F. Wezel; V. Bertolino; G. Bizon; H. M. Bolli; A. M. Borsetti Catì; L. Dondi; H. Feinberg; D. G. Jenkins; E. Perconing, M. Sampo y R. Sprovieri, 1968. Biostratigrafía del Neógeno mediterráneo basada sui foraminiferi planctonici. *Soc. Geol. Ital., Boll.*, 87: 491-503.

Gamero, G. y Díaz de Gamero L., 1963. Estudio de una sección de referencia de las formaciones Cerro Pelado y Socorro en la región de El Saladillo, estado Falcón. "Geos", *Univ. Cent. Venez.*, Caracas. (9): 7-44. Reimpreso 1963 en: *Asoc. Venez. Geol. Min. y Petról.*, Bol. Inform., 7(11): 329-367.

Garner, A. H., 1926. *Suggested nomenclature and correlation of the geological formations in Venezuela*, Am. Inst. Min. Metall. Eng., Tr., p. 677-684.

González de Juana, C., 1937-a. Geología general y estratigrafía de la región de Cumarebo, estado Falcón. *Bol. Geol. y Min.* 1(2-4): 197-217.

González de Juana, C., 1937-b. General geology and stratigraphy of Cumarebo area, State Falcón. *Bol. Geol. y Min.* 1(2-4): 187-205 (ed. en inglés).

Hodson, F., 1926. Venezuela and caribbean turritellas, *Bull. Am. Paleont.*, 11(45): 171-220.

Liddle, R. A., 1928. *The geology of Venezuela and Trinidad*, J. P. MacGowan, Fort Wort, Texas, 552 p.

Liddle, R. A., 1946. *The geology of Venezuela and Trinidad*, 2nd. ed., Paleont. Res. Inst., Ithaca, New York, 890 p.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela (Primera Edición). *Bol. Geol.*, Caracas, Pub. Espec. 1, 664 p.

Petzall, C. K., 1959. Estudio de una sección de la Formación Caujarao en el anticlinal de la Vela, estado Falcón. *Asoc. Venez. Geol. Min. y Petról.*, Bol. Inform., 2(10): 269-320.

Senn, A., 1935. Die stratigraphische Verbreitung der tertiären orbitoiden, mit spezieller Berücksichtigung ihres Vorkommens in Nord-Venezuela und Nord Marokko, *Eclog. Geol. Helv.*, 28(1): 51-113.

Vallenilla L. P., 1961. Estratigrafía de las formaciones Caujarao, La Vela y Coro en sus localidades tipo, estado Falcón. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petról.*, Bol. 4 (12) : 29-78.

Wiedenmayer, C., 1937. Informe geológico sobre los depósitos carboníferos de Coro, distrito Miranda, estado Falcón, *Bol. Geol. y Min.* (Venezuela), 1(1): 65-81.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)