

NEOGENO (Plioceno Temprano)

Estado Falcón

Referencia original: A. L. Payne, 1951, p. 1860.

Consideraciones históricas: Payne (1951) introduce el nombre para designar el miembro superior de la Formación Caujarao en el área de Cumarebo, equivalente lateral del Miembro Corocorote en las secciones en que no está desarrollada la Caliza de Cumarebo ni, consecuentemente, el Miembro Corocorote. Giffuni (1980) lo describe del área de Tocópero. Giffuni *et al.* (1992) precisan la edad de una unidad, principalmente arcillosa, situada por encima de la Caliza de Cumarebo, a la cual no asignan nombre litoestratigráfico. Díaz de Gamero *et al.* (1997) agrupan los estratos equivalentes a la Caliza de Cumarebo (Miembro Portachuelo según Giffuni, 1980) y la sección por encima de la Caliza de Cumarebo y por debajo de la Formación El Veral (Miembro Turupía según Giffuni, 1980), en la región de Tocópero, y la denominan Formación Turupía. Debido a la confusión derivada de tener dos unidades litoestratigráficas, de rango y de definición distintos, con el mismo nombre geográfico, se recomienda considerar el Miembro Turupía de la Formación Caujarao como inválido.

Localidad tipo: Al norte del caserío de Turupía, aunos 3 km al este de la terminación noreste del campo de Cumarebo, distrito Zamora, estado Falcón. Hoja no. 6350, escala 1:100.000, Cartografía Nacional.

Descripción litológica: El miembro consiste casi exclusivamente de arcillas. En el subsuelo, al este y noreste del campo de Cumarebo, la litología incluye arcillas glauconíticas y calcáreas interestratificadas con algunas capas delgadas de limos y arenas (Payne, 1951). Giffuni (1980) describe el Miembro Turupía como consistente de arcillas gris amarillento, masivas, calcáreas, con concreciones ferruginosas. Interestratificadas, aparecen ocasionales calizas marrón claro, bioclásticas.

Espesor: Payne (1951) menciona un espesor de unos 600 m (1800 pies), tanto en superficie como en subsuelo. Giffuni (1980) midió un espesor de 588 m en el área de Tocópero.

Contactos: Payne (1951) considera el Miembro Turupía como equivalente lateral del Miembro Corocorote, cuando este no está desarrollado, es decir, cuando no existe la Caliza de Cumarebo. El mismo autor, coloca el contacto inferior como concordante por encima del Miembro Portachuelo de la Formación Caujarao y discordante por debajo de la Formación El Veral. Giffuni (1980) coloca el contacto inferior como concordante con la Caliza de Cumarebo y el superior como concordante con la Formación El Veral.

Fósiles: Giffuni (1980) presenta una extensa lista de foraminíferos béticos y planctónicos.

Edad: En base al contenido de foraminíferos planctónicos y nannoplancton calcáreo, Giffuni *et al.* (1992) establecen una edad Plioceno Temprano para el miembro (Zona de *Globorotalia margaritae* y zonas NN12 a NN15, de *Amaurolithus tricorniculatus* a *Reticulofenestra pseudoumbilica*).

Paleoambientes: El Miembro de Arcillas de Turupía se sedimentó en el talud superior y representan un sistema de nivel alto (HST) (Giffuni *et al.*, 1992).

© E. Cabrera y G. Giffuni, 1997

(Actualizado por: María Lourdes Díaz de Gamero, agosto 1997)

Referencias

Díaz de Gamero, M. L., G. Giffuni y M. Castro Mora, 1997. Las formaciones Caujarao y Turupía al este de Cumarebo, Falcón nororiental, *Sociedad Venezolana de Geólogos*, Bol., 22(1).

Giffuni, G., 1980. Geología del área de Tocópero y su relación con la cuenca de Agua Salada, estado Falcón, *Trabajo Especial de Grado, Universidad Central de Venezuela*, 245 p., Inédito.

Giffuni, G., M. L. Díaz de Gamero y M. Castro Mora, 1992. Análisis secuencial del Neógeno de la región de Cumarebo, Falcón nororiental, basado en estudios bioestratigráficos, *Soc. Venez. Geol., Bol.*, 46: 7-15.

Payne, A. L., 1951. Cumarebo oil fields, Falcón, Venezuela, *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 35(8): 1850-1878.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Cati, F.; M. L. Colalongo; U. Crescenti; S. D'Onofrio; U. Follador; C. Pirini Raddrizzani; A. Pomesano Cherchi; G. Salvarorini; S. Sartorini; I. Premoli Silva; C. F. Wezel; V. Bertolino; G. Bizon; H. M. Bolli; A. M. Borsetti Catì; L. Dondi; H. Feinberg; D. G. Jenkins; E. Perconing, M. Sampo y R. Sprovieri, 1968. Biostratigrafía del Neogeno mediterraneo basata sui foraminiferi planctonici. *Soc. Geol. Ital., Boll.*, 87: 491-503.

Gamero, G. y Díaz de Gamero L., 1963. Estudio de una sección de referencia de las formaciones Cerro Pelado y Socorro en la región de El Saladillo, estado Falcón. "Geos", *Univ. Cent. Venez., Caracas*. (9): 7-44. Reimpreso 1963 en: *Asoc. Venez. Geol. Min. y Petról., Bol. Inform.*, 7(11): 329-367.

Garner, A. H., 1926. *Suggested nomenclature and correlation of the geological formations in Venezuela*, Am. Inst. Min. Metall. Eng., Tr., p. 677-684.

González de Juana, C., 1937-a. Geología general y estratigrafía de la región de Cumarebo, estado Falcón. *Bol. Geol. y Min.* 1(2-4): 197-217.

González de Juana, C., 1937-b. General geology and stratigraphy of Cumarebo area, State Falcón. *Bol. Geol. y Min.* 1(2-4): 187-205 (ed. en inglés).

Hodson, F., 1926. Venezuela and caribbean turritellas, *Bull. Am. Paleont.*, 11(45): 171-220.

Liddle, R. A., 1928. *The geology of Venezuela and Trinidad*, J. P. MacGowan, Fort Wort, Texas, 552 p.

Liddle, R. A., 1946. *The geology of Venezuela and Trinidad*, 2nd. ed., Paleont. Res. Inst., Ithaca, New York, 890 p.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela (Primera Edición). *Bol. Geol.*, Caracas, Pub. Espec. 1, 664 p.

Petzall, C. K., 1959. Estudio de una sección de la Formación Caujarao en el anticlinal de la Vela, estado Falcón. *Asoc. Venez. Geol. Min. y Petról., Bol. Inform.*, 2(10): 269-320.

Senn, A., 1935. Die stratigraphische Verbreitung der tertiären orbitoiden, mit spezieller Berücksichtigung ihres Vorkommens in Nord-Venezuela und Nord Marokko, *Eclog. Geol. Helv.*, 28(1): 51-113.

Vallenilla L. P., 1961. Estratigrafía de las formaciones Caujarao, La Vela y Coro en sus localidades tipo, estado Falcón. *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol.*, Bol. 4 (12) : 29-78.

Wiedenmayer, C., 1937. Informe geológico sobre los depósitos carboníferos de Coro, distrito Miranda, estado Falcón, *Bol. Geol. y Min.* (Venezuela), 1(1): 65-81.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)