

TERCIARIO (Mioceno Medio)

Estado Monagas

Referencia original: C. Key, 1977.

El nombre de Miembro Yabo fue introducido y publicado originalmente por Key (1977), para designar el intervalo predominantemente lutítico que separa los miembros Jobo y Morichal, de la Formación Oficina, en el campo Jobo; sur de Monagas y el cual consiste en lutitas gris a gris oscuro, macizas a estratificadas, fosilíferas, carbonáceas y micáceas, con capas delgadas de areniscas de grano fino y color gris. En la sección de referencia del pozo Joc-29, el Miembro Yabo ocupa el intervalo de 3518 a 3564 pies (1072 a 1086 m), con 14 m de espesor. El Miembro Yabo suprayace concordantemente al Miembro Morichal de la Formación Oficina, y pasa hacia arriba transicionalmente al Miembro Jobo. Santos y Frontado (1987) extendieron la unidad hasta el sector Cerro Negro, faja petrolífera del Orinoco, al sur del campo Jobo.

Véase [OFICINA, Formación](#).

© *P. Jam L., 1997*

Referencias

Key, C., 1977. La Formación Oficina en el Campo Lobo. *V Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 4: 1599-1615.

Santos A. y L. Frontado, 1987. Reservoir geology of the Cerro Negro stream injection area, Orinoco oil belt, Venezuela, Scientific Press, Beaconsfield; *Journal of Petroleum Geology*, 10(2): 177-194.

Enviar Comentarios



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)