

## PRECAMBRICO TEMPRANO

Estado Bolívar

**Referencia original:** J. Kalliokoski, 1965-a, p. 80.

**Consideraciones históricas:** Este termino fue introducido por Kalliokoski (1965-a), para designar una unidad incluida en su Serie Real Corona (hoy Grupo), compuesta de grandes masas conglomeráticas, expuestas cerca del poblado de Zárate, 3 kilómetros al suroeste de La Flor, estado Bolívar. El nombre es sinónimo del termino "Subunidad Conglomerado" de la Formación Real Corona (hoy Grupo) del mismo autor. Según Kalliokoski (*op. cit.*) la unidad tiene extensión local y posiblemente representa una facies lateral gruesa de la cuarcita de Mápare en el extremo oriental del sinclinal. El autor describió vastos bloques cuadrangulares, distribuidos caóticamente, de conglomerados compuestos de bandas conglomeráticas y cuarcíticas. El conglomerado contiene tres tipos de guijarros cizallados: pardos de cuarzo - andalusita - rutilo - (hematita - magnetita), de hematita especular, y el cuarzo blando sacarino, en una matriz de cuarzo - andalusita - hematita (muscovita), de color variable entre blanco y azul gris. La unidad ha sido metamorfizada a la facies de la corneana hornabléndica, de temperatura y presión moderadas. Por su equivalencia lateral con la Cuarcita de Mápare su edad es posterior a Imataca. Kalliokoski (*op. cit.*) correlacionó la unidad con la Cuarcita de Mápare y con algunos conglomerados de la Formación Cinaruco, y la consideró como mena de hierro de bajo tenor.

© M. E. M., 15 de Octubre de 1997

**Referencias**

Kalliokoski, J., 1965-a. Geology of north-central Guayana Shield, Venezuela. *Geol. Soc. Amer., Bull.*, 76(9): 1027-1050.

[Enviar Comentarios](#)**2a Edicion LEV****Comentarios Recibidos**[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)