


11. Campo Alpuf

El campo Alpuf está ubicado en los Distritos Perijá y Urdaneta del Estado Zulia. La primera actividad exploratoria fue realizada por la Richmond Exploration Company en el año 1926. En esta primera etapa se perforaron seis pozos en el Eoceno, de los cuales cinco fueron abandonados. Después de la nacionalización, para el año 1978, la empresa Corpoven perfora nuevos pozos y descubre petróleo cretácico con el pozo Alpuf-3X; este pozo fue completado en el año 1980.

La actividad exploratoria en este campo se ha concentrado básicamente a la interpretación sísmica, la perforación y la evaluación de pozos.



CAMPO ALPUF PERFORACION EXPLORATORIA			
POZO	AÑO	PROF.FINAL (Mts.)	ULTIMA Fm. ALCANZADA
ALPUF - 1	1926	696	La Villa
36E-1	1947	3497	Guasare
36E-2	1966	4949	Apón
36E-3	1968	5036	Basamento
ALPUF - 2	1969	4162	Mito Juan
36E-4	1971	3332	La Sierra
ALPUF - 3X	1980	5013	Apón
ALPUF - 4X	1981	5154	Apón
ALPUF - 5X	1982	5140	Basamento
ALPUF - 6X	1982	5160	Basamento
ALPUF - 7X	1982	5207	Basamento
ALPUF - 8X	1982	4131	Mito Juan
ALPUF - 9X	1983	5185	Basamento
ALPUF - 10X	1983	5124	Basamento
ALPUF-8AX	1984	5193	Basamento

SECUENCIA ESTRATIGRAFICA DEL AREA ALPUF				
	EDAD	FORMACION	ESPE- SOR (mts.)	LITOLOGIA
QUAT.	RECIENTE	ALUVION		SUELO
	PLIO-PLEIS.	ONDA/EL MILAGRO	500	ARENAS GRANO FINO A GROSAS
T E R C I A R I O	OLIGO - MIOCENO	LA VILLA	1200	ARENAS, ARENISCAS Y ARCILLAS
		LOS RANCHOS		
		CUIBA	750	ARCILLITA, ARENISCAS Y LIGNITOS
		MACOA	390	ARCILLITA, ARENISCAS Y LIGNITOS. SE INTERCORTA CON LA FM. LA ROSA HACIA EL ESTE
		PEROC	700	ARCILLITA, LIMOLITA, ARENISCAS, ANHIDRITA Y LIGNITOS. PASA LATERALMENTE A FM. ICOTEA HACIA EL ESTE
	EOCENO	LA SIERRA	140	ARENISCAS, LIMOLITAS Y LUTITAS CON CARBON
		MISOA	360	ARENISCAS GLAUCONITICAS Y CALCAREAS, LIMOLITAS, LUTITAS
	PALEOC.	MARCELINA	140	ARENISCAS, LIMOLITAS Y CARBON
		GUASARE	130	CALIZAS GLAUCONITICAS Y CALCAREAS CALCAREAS
	CRETACEO	SUP.	MITO JUAN	600
COLON				
SOCUY			25	
MEDIO		LA LUNA	110	
INFER.		NARACA	30	CALIZAS MASIVAS CON INTERCALACIONES DE ARENISCAS CALCAREAS Y CALIZAS ARENOSAS
		LYSURE	140	
	APON	220		
	SIO MEDIO	10	ARENISCAS Y CONGLOMERADOS	
PRE-CRETAC.	BASAMENTO	?	ROCAS IGNEAS-METAMORFICAS	

Estratigrafia: La secuencia estratigráfica en el área Alpuf comprende rocas de edad entre Pre-Cretácico hasta Reciente, con espesor que alcanza los 5.200 mts.

En el Pre-Cretáceo, un Basamento triásico de rocas graníticas. Al oeste, tobas volcánicas y cuarcitas de la Formación Macoita (Jurásico).

En el Cretáceo, areniscas conglomeráticas de Río Negro y concordantes y transicionales, calizas masivas y areniscas calcáreas del Grupo Cogollo; las calizas de la Formación La Luna; la caliza Socuy y las lutitas laminadas de la Formación Colón y del Miembro Mito Juan con delgadas areniscas en la sección superior.


En el Paleoceno, la Formación Guasare (calizas glauconíticas y areniscas calcáreas) y la Formación Marcelina (areniscas, limolitas y carbonos).

En el Eoceno, la Formación Misoa (areniscas glauconíticas calcáreas y lutitas carbonáceas arenosas); y la Formación La Sierra (areniscas, limolitas y lutitas con carbón).

En el Oligoceno-Mioceno, las formaciones Peroc (arcillitas, limolitas, areniscas, anhidrita y lignitos); Macoa (arcillitas, limolitas, areniscas y lignitos); Cuiba e Icotea (arcillitas, areniscas y capas de lignito); La Rosa, Los Ranchos y La Villa (arenas y arcillas).

CUADRO DE CORRELACION EN CAMPO ALPUF

EDAD		OESTE	ESTE
Plioceno			El Milagro Onia
Plioceno			
MIOCENO	Superior	La Villa	La Villa
		Los Ranchos	Los Ranchos
	Medio	Cuiba	Cuiba
	Inferior	Macoa	Macoa / La Rosa
Oligoceno		Paroc	Paroc
Eoceno		Caibola	Caibola
Paleoceno		La Sierra	
		Misoa	Misoa
		Marcellina	Marcellina
		Guasare	Guasare
CRETACEO	Maestricht	Mito Juan	Mito Juan
	Campanense		
	Santonense	Colón	Colón
	Coniacense		
	Turonense	La Luna	La Luna
	Canonariense		
	Albiense	Grupo Cosío	Maraca
		Lisura	Lisura
	Aptiense	Apón	Apón
	Barremiense	Río Negro	Río Negro
Jurásico		Macolta	
Triásico			El Palmar (?)



Estructura: A nivel cretácico (Formación La Luna) presenta al occidente del área un domo alargado de bajo relieve, con dirección norte-sur, que forma parte del anticlinal de San José.

Varios anticlinales fallados de rumbo NE y buzamiento suave constituyen otras estructuras hacia el sureste.

Se han definido dos sistemas de fallamiento: uno de rumbo NO-SE al oeste del área, relacionado con la zona de falla de Macoa, que corta la sección desde el Basamento hasta el Terciario; y otro, NE-SO, de fallas inversas, que sigue el lineamiento de la Sierra de Perijá y, afecta la secuencia estratigráfica, desde el Cretáceo inferior hasta el Plioceno.

Producción: Los pozos producen crudo mediano a liviano en flujo natural con gravedad de 22.5-30.4° API, RGP 530, 0.0 AyS, 200 ppm H₂S.

