


22. Campo García

El campo se encuentra en el noreste de la Cuenca de Maracaibo.

Entre 1928 y 1971 se perforaron sin éxito siete pozos en el área.

El alto potencial de producción alcanzado al noreste por el pozo Z-23H-1x (Urdaneta) en las calizas cretácicas estimuló el interés exploratorio. Se identificaron ocho estructuras. Corpoven perforó 4 pozos desde 1979; 28F-1X alcanzó 17.525.




Estratigrafía: La columna estratigráfica continúa la secuencia de los campos vecinos Boscán y Los Claros.


El miembro arenáceo del Misoa constituye un importante horizonte productor de los campos García, Los Claros y Urdaneta Oeste. Este miembro consiste en una serie de arenas espesas que se correlacionan con las Arenas de Boscán hacia el norte y con B-2 y B-4 en el este; estas areniscas desaparecen al este hacia el Campo Costanero Bolívar donde está representada por lutitas con intercalaciones delgadas de arena compacta de grano fino. Al norte, hacia la Concepción y Maracaibo, desaparece bajo la combinación de cambio a facie lutítica y erosión posteoceana. Hacia el sur, se hacen y forman una continua unidad porosa que llega por lo menos hasta el Miembro B-6.

CAMPO GARCIA COLUMNA ESTRATIGRAFICA				
E O A D	GRUPO	FORMACIÓN	MIEMBRO	DESCRIPCIÓN
PLIO-PLÉISTOC.		DNTA/EL MILAGRO		ARENISCAS FRIABLES
MIÓCENO MEDIO Y SUP.	EL FAUSTO	LA VILLA LOS RANCHOS		ARENISCAS Y ARCILLAS
ALGO-MIÓCENO		ICOTEA		LIMOLITAS, ARENISCAS, LUTITAS.
EÓCENO		MISOA		ARENISCAS
PALEÓCENO		MARCELINA		ARENISCAS CALCÁREAS, CARBONACEAS.
		GUASARE		ARENISCAS CON CALIZAS Y LUTITAS
CRETÁCEO SUP.		COLÓN	MITO JUAN	LUTITAS, LIMOLITAS Y CALIZAS
			SOCUY	CALIZAS, LUTITAS
CRETÁCEO MED.		LA LUNA		CALIZAS Y LUTITAS.
CRETÁCEO INF.	COCOYO	MARACA		CALIZAS
		LISURE		CALIZAS, LUTITAS Y LIMOLITAS
		APÓN		CALIZAS DURAS
		RIO NEGRO		ARENISCAS, CONGLOMERADOS
PRE-CRETÁCEO	BASAMENTO			

Estructura: Básicamente un anticlinal fallado cuyo límite se encuentra parcialmente controlado por la extensión sur de la falla principal de Boscán.



En las formaciones altas, delgadas y lenticulares, capas lutíticas individuales interestratificadas en arenas masivas actúan como barreras locales.



Producción: La producción profunda proviene de yacimientos de calizas cretácicas fracturadas. El pozo 22G-2X probó 2.000 b/d de petróleo de 25° API en la Formación Apón.

© [Ramón Almarza, 1998](#)